

## *Периостит челюсти*

*Периостит челюсти* (острый, хронический) – распространение воспалительного процесса на надкостницу альвеолярного отростка и челюсти.

**Э т и о л о г и я.** Наиболее часто *периостит* является осложнением *периодонтита*, кисты пародонта, результатом травмы, в том числе после удаления зуба. Микроорганизмы проникают через отверстия в компактной пластинке по каналам остеонов либо лимфатическим сосудам.

**К л и н и к а.** Острый гнойный периостит сопровождается крайне резкой болью, усиливающейся при движении челюсти. Боли могут распространяться на всю челюсть, иррадиировать по ходу тройничного нерва в глаз, ухо, висок. Тепловые процедуры усиливают боль, болезненность причинного зуба при этом снижается. На десне и в области окружающих мягких тканей появляется отек. Губа, щека, подглазничная и подчелюстная области, в зависимости от процесса, выглядят припухшими.

Региональные лимфатические узлы увеличены, болезненны. Температура тела обычно поднимается до 37,5-38°C, иногда и выше. В крови отмечаются лейкоцитоз, повышенная СОЭ.

В результате гнойного расплавления тканей гной может выделяться в ротовую полость через свищевой ход. При этом интенсивность болевых ощущений снижается.

При отсутствии лечения развивается хронический периостит, не сопровождающийся выраженным болевым симптомом.

**Л е ч е н и е** проводит стоматолог-хирург. Удаление причинного зуба способствует обратному развитию воспаления. Показано также вскрытие гнойного поднадкостничного очага путем разреза.

После оперативного вмешательства внутрь назначают антибиотики, сульфаниламиды, обезболивающие, жаропонижающие, противовоспалительные средства.