

ПРОРЕЗЫВАНИЕ ЗУБОВ

Прорезывание зубов начинается с возникновения на десне плотных утолщений. На 6-8-м месяце жизни ребенка появляются временные (молочные) зубы – центральные резцы на нижней челюсти, затем верхние центральные резцы.

К 2-2,5 годам завершается прорезывание всех 20 временных зубов: по 4 резца, 2 клыка и 4 моляра на верхней и нижней челюстях.

При прорезывании зубов усиливается слюноотделение. Могут наблюдаться особенно у ослабленных детей, беспокойство, общее недомогание, диспепсические расстройства (понос, потеря аппетита), снижение сопротивляемости организма к инфекциям. Из-за зуда десен ребенок тянет в рот различные предметы и может легко травмировать слизистую оболочку. Необходимо быть внимательным к малышу, помня о его повышенной возбудимости. Нужно подбирать игрушки, которые не будут травмировать десну, обязательно прокипятить их в содовом растворе.

Раннее прорезывание зубов бывает относительно редко. Чаще регистрируется и замедленное прорезывание, связанное с ослабленностью организма (рахит, частые инфекции и другие заболевания).

Прорезывание постоянных зубов, происходящее, как правило, безболезненно, начинается до выпадения молочных с первого моляра (шестого по счету начиная с середины зубного ряда), в 6-летнем возрасте. Важно знать, что шестой зуб – не молочный. Желательно сразу после его появления показаться стоматологу и выполнять рекомендации по предупреждению кариеса.

В 6-9 лет на месте выпавших молочных резцов вырастают постоянные зубы. К 12-13 годам происходит полная смена зубов. У взрослого человека их от 28 до 32, в связи с тем что последние моляры, так называемые зубы мудрости, могут прорезываться в любом возрасте или вовсе отсутствовать.