

Основные психопатологические синдромы детского и подросткового возраста

Педиатрический факультет

Основные психопатологические синдромы детского и подросткового возраста

→ синдром невропатии

→ синдром детского аутизма

→ гипердинамический синдром

→ синдром детских патологических страхов

→ синдром дисморфомании

→ синдром нервной анорексии

→ синдром психического инфантилизма

→ синдром гебоидности

Синдром невропатии

Невропатия – синдром «конституциональной» или врожденной детской «нервности», возникающий до 3-х летнего возраста.

возникает в грудном возрасте

- соматовегетативные расстройства - инверсия сна
- частые срыгивания
- колебание t° до 38°

с возрастом

- частый изнурительный плач
- симптом «закатывания»

аффективно-респираторный приступ

с возрастом проявления синдрома сглаживаются, но служат почвой для более сложных невротических и неврозоподобных синдромов

встречается при

- невротических расстройствах
- резидуально-органических нервно-психических расстройствах
- при шизофрении (с диссоциацией психических процессов)

Синдром детского аутизма

Аутизм - вариант психофизического дизонтогенеза (асинхронии),

- дисгармоничное развитие психики с нарушением коммуникативного поведения на уровне социальной перцепции.

- у мальчиков встречается в 3-4 раза чаще
- встречаются любые уровни умственного развития
- симптомы проявляются с первого года жизни
- включает - отгороженность
 - опережающее развитие речи с нарушением коммуникативности
 - обращенность речи в пространство или к себе
 - слабость эмоционального реагирования
 - невозможность дифференцировать людей
 - недостаточность и отставленность реакций
 - симптом тождества
 - однообразное поведение с двигательными стереотипиями
 - непереносимость взгляда, взгляд мимо собеседника
 - однообразие неролевых аутистических игр
 - задержка и нарушение моторных навыков
 - нарушение навыков опрятности
 - патологические привычки
- встречается при - болезни Каннера (ядерный вариант РДА)
 - детской шизофрении (+ диссоциация психических процессов)

Гипердинамический синдром (СДВГ)

- синдром психомоторной расторможенности, возникающий в 3–7 лет у мальчиков встречается в несколько раз чаще

проявляется: - чрезмерной подвижностью - несобранностью

- неусидчивостью

- приводит к дезадаптации

- суетливостью

обязательные симптомы - неустойчивость внимания

- отвлекаемость

- повышенная истощаемость

- нарушение целенаправленной деятельности

дополнительные симптомы - импульсивность - тики - гиперкинезы

- задержка моторного и психического развития

варианты синдрома - СДВГ с преобладанием гиперактивности

- СДВГ с дефицитом внимания

- комбинированный тип

нарушения проявляются более чем в 1 ситуации (дом, школа, улица)

встречается:

- как отдельная нозология

- при реактивных состояниях

- при маниакальных расстройствах

- при шизофрении

Синдром детских патологических страхов

- возникает при различных психических заболеваниях с раннего возраста, но очерченность приобретает в возрасте 6–7 лет

Формы страхов

1. **Навязчивые страхи** - возникают непроизвольно, независимо от желаний, с критическим отношением
 - нозофобия, клаустрофобия, страх высоты и т.д.
2. **Сверхценные страхи** - доминируют в сознании с убежденностью в их обоснованности, отсутствуют попытки его преодолеть
 - дошкольный возраст - страхи животных
 - персонажей сказок
 - школьный возраст - страх темноты - одиночества
 - за жизнь и здоровье родных
3. **Бредовые страхи** - не зависят от психотравмы, с тревогой, могут сочетаться с галлюцинациями
4. **Ночные страхи** - при пробуждении во время сна
5. **Недифференцированные страхи** - беспредметные, с сомато-вегетативным компонентом

Синдром дисморфомании

- болезненная убежденность (сверхценная или бредовая) в наличии у себя какого-либо воображаемого или переоцениваемого дефекта внешности или функции

встречается в подростковом или юношеском возрасте

ведущие симптомы - косметическая дисморфомания

- парфюмерная дисморфомания

обязательные симптомы - пониженно-напряженное настроение

- «симптом зеркала»

- «симптом фотографии»

- аутодеструктивное поведение

Триада симптомов - идеи физического недостатка

- идеи отношения

- подавленное настроение

встречается - при психопатиях и акцентуациях

- как подростковый синдром

- при шизофрении

Синдром нервной анорексии

- упорное стремление к снижению массы тела
- чаще у девушек подросткового и юношеского возраста
- ведущий симптом - сверхценная или бредовая убежденность в избыточной массе тела
- обязательный симптом - сверхценное или бредовое поведение, направленное на снижение веса

Стадии синдрома

- 1. Дисморфоманическая** - от 6 месяцев до 2–3 лет
 - «ужас ожирения», качественные и количественные ограничения
- 2. Аноректическая** - от 6 месяцев до 1,5 лет
 - упорное ограничение в еде, эндокринные нарушения, гиперкомпенсаторное поведение
- 3. Кахектическая** - истощение, пролежни, трофические язвы
- 4. Этап редукции**

- встречается - как отдельное заболевание подросткового возраста
- при шизофрении

Синдром психического инфантилизма

- психическая незрелость с нарушением темпа созревания психики
отставание развития эмоционально-волевых свойств личности
обнаруживается в младшем школьном возрасте

Простой вариант психического инфантилизма

- незрелость охватывает все сферы деятельности ребенка
- преобладает эмоционально-волевая задержка
- беспечность, беззаботность, неумоимость в играх
- живость воображения, жизнерадостность
- доминирует игровая деятельность, стремление к удовольствиям
- школьная неуспеваемость (дезадаптация) при предъявлении возрастных требований
- признаки соматической незрелости, задержка в росте, хрупкое телосложение

встречается - как отдельный синдром

- при ЗПР
- при социальной запущенности

Синдром гебоидности

- синдром патологии формирующейся личности

возникает в юношеском возрасте

симптомы «вырастают» из психологии пубертата

- патологически преувеличенные и заостренные пубертатные свойства
- аффективно-волевые нарушения и патология влечений
- выраженная социальная дезадаптация

ведущие симптомы - сверхценные образования - отвлеченные занятия

- патологические влечения - унижение окружающих
- оскорбительное высокомерие
- явления стереотипий в поступках и поведении

встречается - при вялотекущей шизофрении

- как патологический пубертатный криз
- при формирующейся психопатии