

Имплантация.

Развитие внезародышевых органов.

Амниотическая и хориальная оболочки.

Лекция 4

Периодизация пренатального периода развития

- Предэмбриональный (зародышевый) период от оплодотворения до конца 3-й недели развития: дробление, стадия морулы, бластулы, гаструляция, дифференцировка зародышевых листков.
- Эмбриональный период с 4-ой по 8-ую неделю:
 гистогенез, органогенез.
- Плодный период с 9-ой недели до рождения: дальнейшая дифференцировка тканей, формирование органов и систем.

Ранняя стадия имплантации.



4-ый день – образование бластоцели у морулы и превращение морулы в бластулу.

В течение 2-х дней бластоциста содержится в полости матки, омываемая ее секретом.

5-ый день – исчезновение блестящей оболочки.

6-ой день - прикрепление бластоцисты к эпителию эндометрия.


РЕМИТИТЕЛЬНЫ



Начиная с 6-го дня — проникновение трофобласта в слизистую оболочку матки. Инвазии способствуют интегрины, экспрессируемые клетками трофобластического эпителия, а также молекулы экстрацеллюлярного матрикса — ламинин и фибронектин. Эти молекулы взаимодействуют, обеспечивая сигнальную трансдукцию, регулирующую дифференцировку трофобласта.

Имплантация – 7ой день внутриутробного развития.

К концу 1-ой недели бластоциста поверхностно имплантирована в эндометрий.




К концу 1-ой недели:


Зигота человека прошла стадию морулы и находится на стадии бластулы.

Бластоциста начала имплантироваться в слизистую оболочку матки.

Изменения в матке и яичнике по ходу менструально- овариального цикла в отсутствие олодотворения



Изменения в матке и яичнике по ходу менструальноовариального цикла при оплодотворении



Оплодотворение, дробление, образование морулы, формирование бластулы, имплантация



1-я неделя развития: 1- ооцит после овуляции, 2 –оплодотворение (12-24 часа после овуляции), 3- стадия муж. И жен. пронуклеусов, 4 – веретено 1-го митотического деления, 5 – 2-стадия 2-х бластомеров (30 часов), 6 – морула из 12-16 бластомеров, 7 – морула достигает полости матки (4 дня), 8 – ранняя бластоциста (4.5 дней), 9 – имплантация (бластоциста 6 дней). В яичнике показана трансформация фолликулов (от первичного до третичного и желтого тела). В эндометрии – секреторная фаза.

выводы:

- 1) Результат оплодотворения:
- Восстановление диплоидного набора хромосом,
- **В Определение пола будущего ребенка,**
- **ж** Инициирование дробления.
- 2) Дробление это серия митотических делений зиготы с образованием бластомеров, уменьшающихся в размерах с каждым последующим делением.
- 3) После 3-х делений бластомеры подвергаются компактизации, в результате чего происходит их разделение на внутреннюю и наружную клеточные массы. Компактные бластомеры образуют 16-клеточную морулу.
- 4) На 3-ий 4-ый день после оплодотворения в моруле, попадающей в полость матки, образуется полость бластоцель, и она превращается в бластоцисту.
- 5) Внутренняя клеточная масса (мелкие бластомеры) дает начало эмбриобласту, а наружная трофобласту.

Клинические корреляции

1) Оплодотворение in vitro (пересадка морулы в полость матки). Проблема синхронизации (замедления развития эмбриона на 20-30%).

2) Раннее спонтанное самопроизвольное прерывание беременности (не менее 15% всех зигот). Естественный пренатальный скриннинг эмбрионов.

День 8-ой. Размер зародыша - 0.1 мм

На 8-й день бластоциста частично погружена в строму Клетки эндометрия. цитотрофобласта делятся И мигрируют B синцитиотрофобласт, где утрачивают сливаются Между границы. клеточные эмбриобласта клетками появляются мелкие которые, пространства, образуют сливаясь, амниотическую полость. По мере ее образования, меняется эмбриобласт сам превращается плоский, В первоначально округлый диск.



Частично имплантиро- ванная бластоциста на 8-ой день развития



Клетки эмбриобласта также дифференцируются в два слоя: слой мелких кубических клеток, прилежащих к бластоцели, становится гипобластом, а слой высоких цилиндрических клеток, прилежащих к амниотической полости – эпибластом. Эпибласт и гипобласт вместе составляют плоский двухслойный зародышевый диск.

13

Начало 2 -й недели:

- **Ж** Дальнейшая имплантация бластоцисты
- ⇒ Эмбриобласт → эпибласт
 - → гипобласт

- ⇒ Трофобласт → цитотрофобласт
 - → синцитиотрофобласт

Бластоцита человека. 8-ой день.



По мере увеличения амниотической полости тонкая эпителиальная крыша – амнион – образуется из клеток цитотрофобласта. Эпибласт образует дно амниотической полости и продолжается по периферии в амнион. 15

Бластоциста, 9-ый день.

Лакуны синцитиотрофобласта вскоре устанавливают контакты железами и сосудами матки. Клетки эпи-бласта, прилежащие к цитотрофобласту, называются амнио-бласты. Вместе остальными клетками эпибласта ОНИ высти-лают амниотическую полость.



Одновременно другие клетки, вероятно из гипобласта, образуют тоную экзоцеломическую мембрану (Хойзеровскую), которая выстилает, вместе с гипобластом, полость первичного желточного мешка. (экзоцеломической полости).

Бластоциста человека, 9-ый день. Двухслойный зародышевый диск в лакунарной стадии.



Бластоциста глубже погружается в эндометрий, и дефект в поверхностном эпителии, образовавшийся при имплантации, закрывается фибриновым сгустком. Трофобласт интенсивно развивается, особенно на эмбриональном полюсе, где в синцитии появляются вакуоли. Сливаясь, вакуоли образуют большие лакуны — это лакунарная стадия развития трофобласта. Сеть лакун — это прообраз межворсиночных пространств плаценты.

Бластоциста, 9-ый день.

Лакуны синцитиотрофобласта вскоре устанавливают контакты с железами сосудами матки. Клетки эпибласта, прилежащие к цитотрофобласту, называются амниобласты. Вместе с остальными клетками эпибласта выстилают амниотическую полость.



Одновременно другие клетки, вероятно из гипобласта, образуют тоную экзоцеломическю мембрану (Хойзеровскую), которая выстилает, вместе с гипобластом, полость первичного желточного мешка. (экзоцеломической полости).

Амнион и амниотический пузырек (9-ый день)

- **Амниотический пузырек маленькая полость в эпибласте**
- Выстлан эпибластом и амниобластами


Первичный желточный мешок – экзоцеломическая полость

- Обращен к энтодерме (гипобласту)
- Выстлан мембраной Хойзера, происходящей из гипобласта (противоречие).

Капилляры эндометрия вокруг имплантированного эмбриона расширяются, формируют синусоиды, и стенка некоторых из них «разъедается»


синцитиотрофобластом. Материнская кровь изливается в лакунарную сеть синцитиотрофобласта, устанавливая первичную маточно-плацентарную циркуляцию, которая начинает питать ткани эмбриона.

Новая популяция клеток появляется между внутренней поверхностью цитотрофобласта и наружной поверхностью экзоцеломической полости. Эти клетки, происходящие из желточного мешка, образуют рыхлую соединительную ткань – внезародышевую мезодерму.



Бластоциста, 12 дней.

Дефект в эпителии эндометрия уже не виден: эмбрион полностью погружен в толщу эндометрия, слегка выбухая в полость матки.



Внезародышевая мезодерма в конце концов заполняет все пространство между трофобластом снаружи и амнионом/экзоцеломической мембраной изнутри. Полости, появляющиеся в ней, сливаются, образуя внезародышевый целом или полость хориона.

Внезародышевая мезодерма разделяется на внезародышевую сомато-(между плевру цитотрофобласто м и амнионом) и внезародышевую спланхноплевру (между цитотрофобластом желточным мешком.



ОБРАЗОВАНИЕ ВНЕЗАРОДЫШЕВОЙ МЕЗОДЕРМЫ

22

Основные события 2-ой недели:

Образование:

- **Внезародышевой мезодермы**
- Внезародышевого целома
- Внезародышевой соматоплевры
- Внезародышевой спланхноплевры, а также
- ***** Хориальной пластинки
- ***** Амниотической ножки

Клинические корреляции

- Ж К 13-му дню поверхностный дефект в эндометрии обычно заживает.
- **В Иногда в месте имплантации возникает кровотечение в результате усиленного кровотока в лакунарном пространстве.**
- Поскольку это кровотечение возникает около 28-го дня менструально-овариального цикла, его можно ошибочно принять за менструальное кровотечение, что в итоге приводит к неточному определению срока беременности.

Трофобласт приобре-тает ворсинчатую структуру. Клетки цитотрофобласта пролиферируют внедряются В синцитиотрофобласт, образуя выросты, покрытые синцитием — это ворсины. первичные Внезародышевый целом окружает первичный желточный мешок амниотический пузырек со сторон, **3a BCEX** исключением участ-ка, где амниотическая ножка прикрепляет зародышевый щиток к трофобласту.



Бластоциста, 13 дней. Формиро-вание вторичного желточного мешка 25

Внезародышесоматоплевра вая (=хориальная пластинка) вместе трофобластом COCтавляет хорион. Внутри первичного желточного формируется мешка вторичный желточный мере мешок ПО отщипывания фрагментов OT первичного желточного мешка И соответствующего уменьшения его полости.



внезародышевая соматомезодерма

первичная ворсина

хорион

внезародышевая спланхно мезодерма первичный желточный мешок

внезародышевый целом

Бластоциста человека, 13 дней⁶


Бластоциста, 14 дней.

Экзоцеломические кисты ЭТО фрагменты бывшего первичного мешка/ желточного экзоцеломической полости, отошедшие при OT него формировании вторичного желточного мешка: часто ОНИ обнаруживаются полости хориона.



первичная ворсина амниотическая ножка прехордальная ппастициа вторичный желточный MAIIIAK внезародышевая соматомезодерма

остатки первичного желточного мешка восстановленный поверхностный эпителий Эмбрион человека, 14 дней.



К концу 2-ой недели зародышевый диск представлен двумя противолежащими слоями: эпибластом, образующим дно все расширяющейся амниотической полости, и гипобластом, образующим крышу вторичного желточного мешка. В головном конце гипобласт образует утолщение — рото-глоточную мембрану/прехордальную пластинку. Это область цилиндрических клеток, плотно прикрепленных к надлежащему эпибласту.

выводы.


2-я неделя – неделя пар:

- Трофобласт делится на 2 слоя: цитотрофобласт и синцитиотрофобласт.
- Эмбриобласт расщепляется на 2 слоя: эпибласт и гипобласт.
- Внезародышевая мезодерма расщепляется на 2 части:
 внезародышевые соматоплевра и спланхноплевра.
- В бластоцисте формируются 2 полости амниотический пузырек и желточный мешок.

Клинические корреляции.

- 1. Синцитиотрофобласт ХГТ тесты на беременность к концу 2-ой недели.
- 2. Имплантация в области внутреннего зева предлежание плаценты маточное кровотечение.


3. Внематочная беременность: трубная – 90% (1:80- 1:250). Реже – шеечная, абдоминальная.



Трубная беременность:

- ***** Чаще развивается в ампуле трубы.
- Причина трубная инфекция, тазовые воспалительные заболевания (нарушение пассажа зиготы).
- Приводит к разрыву трубы, кровотечению в первые 8 недель беременности, гибели эмбриона.
- ***** Требуется хирургическое лечение.
- **Разрыв трубы и осложняющее его кровотечение имеют большую клиническую значимость, так как угрожают жизни матери.**

Трубная беременность



Внематочная беременность в Дугласовом пространстве.



Клинические корреляции

- 4. Контрацепция.
- Пероральная контрацепция большие дозы эстрогенов (диэтилстильбэстрол) предотвращение имплантации.

Внутриматочные контрацептивные средства – предотвращение имплантации.

Контрацепция предпочтительнее контраимплантации.

Результат 2-ой недели развития:

- Завершение имплантации
- **Дифференцировка трофобласта, формирование хориона**
- **Формирование 2-слойного зародыша**
- Формирование амниона, амниотического пузырька, первичного и вторичного желточного мешков
- Появление первичной мезодермы (внезародышевой)
- Развитие хориона, внезародышевого целома
- Образование амниотической ножки

Амниотический пузырек

На 8-ой день эмбриобласт дифференцируется на эпи- и гипобласт.


- В эпибласте появляется маленькая полость амниотический пузырек. Его выстилают клетки амниобласты (происходят из эпибласта) и сама поверхность эпибласта.
- Амниотический пузырек содержит амниотическую жидкость.

Амнион и амниотический пузырек (9-ый день)

- **Амниотический пузырек маленькая полость в эпибласте**
- Выстлан эпибластом и амниобластам
- Первичный желточный мешок экзоцеломическая полость
- Обращен к энтодерме (гипобласту)
- Выстлан мембраной Хойзера, происходящей из гипобласта (противоречие).

Бластоциста, 12 дней.

Дефект в эпителии эндометрия уже не виден: эмбрион полностью погружен в толщу эндометрия, слегка выбухая в полость матки.



Внезародышевая мезодерма в конце концов заполняет все пространство между трофобластом снаружи и амнионом/экзоцеломической мембраной изнутри. Полости, появляющиеся в ней, сливаются, образуя внезародышевый целом или полость хориона.

38

Внезародышевая соматоплевра (=хориальная пластинка) трофобластом вместе с составляет хорион. Внутри первичного мешка желточного формируется вторичный желточный мешок по мере отщипывания фрагментов от первичного желточного мешка и соответствующего уменьшения его полости. К 2-ой недели концу эндометрий трансформирован децидуальную оболочку.



внезародышевая соматомезодерма

первичная ворсина

хорион

внезародышевая спланхно мезодерма первичный желточный мешок

внезародышевый целом

Бластоциста, 14 дней.

Экзоцеломические кисты ЭТО фрагменты бывшего первичного мешка/ желточного экзоцеломической отошедшие полости, при OT него формировании вторичного желточного мешка: часто ОНИ обнаруживаются полости хориона.

материнская кровь целом 1


остатки первичного желточного мешка

первичная ворсина ская ножка прехордальвнезародытомезодерма

восстановленный поверхностный эпителий


ЖЕЛТОЧНЫЙ МЕШОК

- Экзоцеломическая полость, образование которой связано с гипобластом, трансформируется в первичный желточный мешок.
- Зародышевый щиток лежит между амниотическим пузырьком и первичным желточным мешком.
- Внезародышевая мезодерма развивается из выстилки желточного мешка.
- Благодаря развитию внезародышевого целома, значительная часть объема первичного желточного мешка отщепляется от него, и формируется вторичный желточный мешок.




Эмбрион человека, 2 недели. Зародышевый диск прикреплен к трофобласту посредством амниотической ножки.

Зародышевый диск 16-дневного эмбриона (указаны перемещения поверхностных клеток эпибласта через первичную полоску и первичный узелок).



Каудальнее первичной полоски образуется циркулярная область – клоакальная мембрана. Зародышевый диск остается в этих местах двухслойным, так как эктодерма и энтодерма здесь срастаются.


С появлением клоакальной мембраны задняя стенка желточного мешка образует пальцевидный вырост от своей каудальной стенки, который внедряется в амниотическую ножку. Так образуется аллантоис (Greek "allantos" = "sausage"). У низших позвоночных он служит резервуаром для продуктов экскреции выделительной системой.



Аллантоис

- Образуется на 16-ый день, когда желточный мешок образует небольшой дивертикул, простирающийся в амниотическую ножку.
- У человека он остается рудиментарным, но может вовлекаться в ранний гемопоэз и ангиогенез, а также участвует в развитии мочевого пузыря. Может принимать участие в формировании пороков развития мочевого пузыря.
- По мере увеличения мочевого пузыря становится первичным мочевым протоком (urachus).


Развитие внезародышевых органов



К концу 5-ой недели желточный мешок и амниотическая ножка соединятся для образования пупочного канатика.


Образование пупочного канатика

У 3-х недельного эмбриона желточный мешок находится в полости хориона. В дальнейшем амниотическая полость увеличивается за счет полости хориона и амнион начинает покрывать будущую амниотическую ножку и желточный стебель, собирая их вместе и давая начало примитивному пупочному канатику.



Образование пупочного канатика, развитие желточного мешка.

дистальном отделе пупочный содержит канатик желточный мешок и пупочные сосуды, а в проксимальном – петли кишки и остатки аллантоиса (С). К 10-ой неделе желточный мешок все еше обнаруживается в полости хориона, соединяясь с пупочным канатиком желточным стеблем. В конце 3-го месяца амнион так расширяется, что начинает контактировать с хорионом, облитерируя полость хориона. Тогда желточный мешок сморщивается до грушевидного остатка диаметром мм, соединенным со средней кишкой узким желточным стеблем, который вскоре облитерируется.



Желточный мешок:


- У человека не имеет значения как резерв питательный веществ (желтка),
- Имеет значение как первичный орган гемопоэза и источник половых клеток.

Пупочный канатик

- Развивается из амниотической ножки, образованной в свою очередь внезародышевой мезодермой.
- Соединяет плод и плаценту.
- Диаметр 1-2 см
- Длина 39 90 см
- Содержит 2 артерии и 1 вену.
- Содержит слизистую соединительную ткань (вартонов студень)
- Остатки аллантоиса и первичного мешка могут персистировать до конца плодного периода.

20-недельный плод с истинным узлом пупочного канатика (true knot)






12-недельный плод внутри амниотической полости



Ребенок с ампутацией правой стопы из-за образования амниотических лент



Изредка разрывы амниона приводят к образованию амниотических лент, которые могут странгулировать конечности и, особенно, пальцы. Ампутации и кольцевые констрикции могут развиваться у плода.

Амниотическая полость:

- Заполнена жидкостью, продуцируемой амниобластами,
- Содержит 30 мл жидкости при сроке 10 недель беременности, 350 мл -20 недель, 800-1000 мл при 37 неделях,
- Жидкость поглощает толчки, предотвращает прилипание эмбриона к амниону, позволяет плоду двигаться.
- Объем жидкости замещается каждые 3 часа.
- С начала 5-го месяца плод заглатывает амниотическую жидкость (400 мл в день).
- Моча плода выделяется в амниотическую жидкость с 5-го месяца.