Введение в дерматологию

Анатомия, гистология, физиология и гистопатология кожи



▶ Кожа состоит из 3 отделов: верхнего — эпидермиса (толщина — 0,07-1,4 мм), собственно кожи (дермы) и гиподермы (подкожно-жировой клетчатки), толщина и вес которой сильно варьируют.


Эпидермис.

▶ Состоит из 5 слоев, каждый из которых различен по морфологии и функции. Нижний (базальный) (stratum basale) герминативный располагается на базальной мембране, разделяющей эпидермис от дермы. Состоит из 1-2 рядов цилиндрических клеток с крупными ядрами, богатыми хроматином. До 90% клеток этого слоя - базальные кератинобласты, назначение которых - в результате эволюции превращаться в кератин рогового слоя.

- Базальный слой состоит из герминативных клеток, в которых наблюдается большое количество митозов. Этот слой является основой формирования всех остальных вышележащих слоев. Здесь синтезируется предшественник кератина прекератин.
- ▶ Среди этих клеток и над ними располагаются меланоциты клетки синтезирующие кожный пигмент меланин. У лиц с белой кожей меланин находится над верхним полюсом ядер базальных клеток, защищая ядерную субстанцию от лучевых повреждений и мутаций.

В нижних полюсах меланоцитов и базальных клеток имеются отростки или выросты (якорные тонофиламенты), которые плотно вплетаются в базальную мембрану. С вышележащим шиповатым слоем базальный анастомозируется цитоплазматическими мостиками.

▶ Шиповатый слой (stratum) spinozum). Состоит из 5-15 рядов полигональных (многоугольных) клеток, имеющих большое количество отростков цитоплазмы периферии, которые сплетаются с такими же пучками соседних клеток. По мере продвижения к поверхности шиповатые клетки теряют свою полигональность и уплощаются. В шиповатом слое также наблюдаются мито-(при регенерации, 3Ы лекарственном или физическом воздействии), поэтому базальный и шиповатый слои иногда объединяют "ростковый" слой. В



- Частично в базальном, но в основном в шиповатом залегают гигантские дендрические (древовидные) клетки Лангерганса.
- Эти клетки являются антигенпредставительскими, т. е. они передают информацию об антигенном составе возбудителей или инородных тел лимфоцитам для выработки иммунного ответа.

Зернистый слой (stratum granulosum).

▶ Состоит из 1-3 рядов веретенообразных клеток, вокруг ядер в цитоплазме значительное количество зерен кератогиалина (белковой субстанции, подвергающейся изменениям в процессе ороговения). Ядра в клетках постепенно разрушаются.

Блестящий слой (stratum lucidum).

- Можно обнаружить только в местах физиологического гиперкератоза. Продолжающиеся процессы ороговения белкового вещества приводят к резким изменениям клетки, цитоплазмы и ядра. Они образуют сплошное гомогенное вещество, похожее на стекло и преломляющее свет.
- Слой состоит из 2-3 рядов безъядерных, прозрачных клеток, богатых гликогеном, элеидином, жирными кислотами и липоидами.

Роговой слой (stratum corneum).

▶ Вершина жизнедеятельности всего эпидермиса, без которого жизнь была бы невозможна. Служит барьером между внешней и внутренней средой. Толщина рогового слоя на сгибательных поверхностях предплечья - 0,02 мм, максимальная толщина - на подошвах (до 0,5 и более мм). Представляют собой полностью ороговевшие (заполненные кератином) клетки, лишённые ядер и клеточных структур.

КИНЖИН рядах рогового СЛОЯ межклеточных пространств нет, клетки бы вколочены друг как В друга, обеспечивая механическую жесткость B наружных отделах клетки коже. плоские, роговые, рыхло ссыхаются в постоянно слущивающиеся сидящие И чешуйки роговые (процесс физиологического шелушения).


Таким образом, кератинизация (т.е. эволюция базального эпидермоцита в роговую чешуйку) представляет собой важнейшую функцию кожи, которая обеспечивает:

- ▶ 1. слущивание омертвевших чешуек вместе с микроорганизмами
- > 2. быстрое заполнение дефектов кожи при травмах
- 3. механическая защита и непроницаемость из-за высокой плотности

- В норме превращение базальной клетки в роговую происходит за 13 дней, а полное обновление эпидермиса за 28.
- ▶ В то же время, эпителизация ссадин в пределах эпидермиса проходит за 3-5 дней.

Дерма (собственно кожа).

Как и всякая соединительная ткань состоит из 3 составных частей — волокнистых структур, основного или межуточного вещества и клеточных элементов ретикулогистиоцитарной системы. Условно делится на два слоя: сосочковый и сетчатый. Граница проходит по воображаемой линии, проходящей по нижнему краю эпидермальных гребешков.




Волокнистые структуры.

Представлены коллагеновыми, эластическими и ретикулиновыми волокнами. Коллагеновые

ВОЛОКНа состоят из пучков фибриллярных нитей (коллаген) и составляют 98 % соединительной ткани. В сетчатом слое коллагеновые волокна и пучки толстые, грубые, располагаются параллельно поверхности кожи и пересекаясь, образуют сетку (отсюда название слоя). В сосочковом слое пучки нежные, тонкие, располагаются беспорядочно.

 Коллагеновые волокна определяют физико-химические свойства кожи (прежде всего прочность).



Эластические волокна - прямые или волнистые, обладают эластичностью и опутывают как чулком каждый коллагеновый пучок - этим создаётся необычайная крепость дермы. Эластические волокна отличаются ригидностью, что предохраняет кожу от излишнего растяжения.

- Ретикулиновые волокна (аргирофильные) образуют третью систему волокон.
- ▶В здоровой коже они образуют две мембраны: наружную и внутреннюю.
- ► Наружная или базальная мембрана отделяет эпидермис от дермы, а внутренняя - окружает стенки сосудов, придатков кожи.

Основное (межуточное) вещество.

- Представляет собой желеобразную массу, в которую погружены все компоненты соединительной ткани, составляет 20% веса тела и играет большую биологическую роль как внутренняя среда организма.
- Оно состоит из кислых и нейтральных мукополисахаридов очень лабильных комплексов, постоянно полимеризирующихся и деполимеризирующихся. Кроме того, в состав основного вещества входят вода, альбумины, неорганические соли и метаболиты.

Функции основного вещества:

▶ 1. Метаболизм воды в организме. Чем гуще основное вещество, тем больше его полимеризация, тем больше воды оно удерживает. Гидростатическое давление основного вещества противостоит гидростатическому давлению крови, поэтому при деполимеризации происходит расширение сосудов.

- ▶ 2. Трофическая. Больше половины глобулина не участвует в лимфо- и кровообращении и концентрируется в основном веществе. Поэтому свободный белок поглощается клетками и служит им материалом для синтеза клеточных белков.
- >3. Цементирующая функция.

Клетки

ретикулогистиоцитарной системы.

- В здоровой коже встречаются два вида клеток тучные клетки и фибробласты (96-99%).
- ▶ Тучные клетки (тканевые базофилы) располагаются периваскулярно и в цитоплазме содержат крупные гранулы. При дегрануляции (выбросе гранул за пределы цитоплазмы или растворении их содержимого в цитоплазме) высвобождаются биологически-активные вещества (гистамин, серотонин, холинэстераза, гепарин единственный источник в организме, брадикинин и другие медиаторы воспаления).

Фибробласты располагаются также вокруг сосудов и между коллагеновыми пучками. участвуют в синтезе (внутренней колластрамина волокна) и основного коллагенового вещества. Кроме того, фибробласты синтезируют фибронектин – участника неспецифической резистентности (фагоцитоз) и специфических иммунных реакций

- Фибробласты малодифференцированные клетки. Поэтому при воспалении они трансформируются в гистиоциты, макрофаги, лимфоциты, плазматические клетки, играющие основную роль в клеточных иммунологических реакциях.
- Таким образом, клетки соединительной ткани участвуют в иммунных реакциях по элиминации антигенного раздражителя на месте внедрения.

ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА.

▶ Толстые коллагеновые пучки образуют грубопетлистую сеть, в которой расположены жировые дольки, состоящие из жировых клеток, сплошь заполненных жиром. В подкожной клетчатке в эмбриональном периоде происходило кроветворение, в дальнейшем эта функция мозгу. Рыхлая переходит к костному подкладка жировой клетчатки обуславливает подвижное прикрепление к коже и предохраняет её от разрывов, переохлаждения.

- ▶Кроме того, жировая клетчатка является энергетическим депо организма и депо крови (в её сосудах может скапливаться до 1 литра крови).
- Адипоциты активно синтезируют гормоны и цитокины (обмен глюкозы, липидов, гормоны воспаления, регуляция давления и коагуляции и др.)

сосудистая система кожи.

- Артерии, проходя подкожно-жировой слой, образуют на границе между последней и дермой глубокую сосудистую сеть, питающую жировые дольки, волосы, потовые железы.
- ▶ От глубокой сети перпендикулярно поднимаются вверх тонкие артериолы, в сосочках распадающиеся на тончайшие капилляры. Это поверхностная сосудистая сеть осуществляет питание эпидермиса, который собственных сосудов не имеет.

ИННЕРВАЦИЯ КОЖИ.

Являясь пограничным с внешней средой органом, кожа обильно снабжена нервными окончаниями, тесно связанными с центральной и вегетативной нервными системами. В межклеточных канальцах базального и шиповатого слоев находятся свободные неинкапсулированные нервные окончания, воспринимающие боль (они также ответственны за развитие чувства зуда). На каждый квадратный сантиметр их насчитывается до 250.

- В сосочковом слое дермы располагаются тельца Меркеля-Мейснера (25-50 на 1 мм2) специализированные окончания, воспринимающие тактильную чувствительность (осязательные нервы).
- Колбы Краузе располагаются в подсосочковом слое (около 20 на 1 мм2) и воспринимают холод.
- ► Тельца Руффини залегают в сетчатом слое (2-5 на 1 мм2), они воспринимают тепло.
- В подкожно-жировой клетчатке располагаются тельца Фаттер-Паччини, воспринимающие чувство давления.

придатки кожи.

- К ним относят потовые и сальные железы, волосы, ногти.
- Потовые железы. В зависимости от морфологии, сроков начала функционирования и функциональных особенностей различают эккриновые (мерокриновые) и апокриновые потовые железы.
- Эккриновые происходят из эпидермиса, имеются всюду, кроме красной каймы губ, головки члена, внутреннего листка крайней плоти, малых половых губ. Особенно их много на ладонях и подошвах (до 500 на 1см2).

▶Потовыми железами выделяется вода, минеральные соли, мочевина, мочевая кислота. Кроме того, в поте обнаружено производное гистидина - урокановая кислота, обладающая защитным свойством от ультрафиолетовых лучей. Потовая железа имеет трубчатое строение, в виде клубочка располагается в подкожно-жировом слое или на границе с дермой. Извитой выводной канал предохраняет клубочек от проникновения пыли и инфекции и выходит на поверхность кожи свободно, т.е. не связан с устьем волосяного фолликула.

Апокриновые потовые железы располагаются в подмышечных впадинах, в коже половых органов, грудных желез, у заднего прохода и открываются в устье фолликулов. Пот этих желез богат летучими жирными кислотами и эфирными соединениями, придающими поту индивидуальный запах. Функционировать они начинают с периода полового созревания и поэтому их рассматривают как добавочные сексуальные железы.

- Функция потовых желез заключается в терморегуляции путем потоотделения (пример - эктодермальная дисплазия), выведении метаболитов.
- ▶ Патология потовых желёз: гипергидроз (потливость), ангидроз (при ихтиозе), стафиллококковое поражение (гидраденит)

Сальные железы.

- Кроме ладоней и подошв есть всюду. Они относятся к альвеолярным голокриновым железам, т.е. образование секрета происходит за счет разрушения собственных клеток. Клетки стенок железы и выводного протока являются продолжением базального слоя эпидермиса.
- Выводной проток впадает в верхнюю 1/3 волосяного фолликула. Секрет кожное сало, содержит жирные кислоты, глицерин, мыла, белок, гликоген, фосфорную кислоту и др. вещества.

▶ Максимальное количество (до 900/см2) сальных желёз с наибольшей функциональной активностью находится в т.н. себорейной зоне (лицо, верхняя часть спины, область грудины, волосистая часть головы) – acne vulgaris

- ▶ При смешивании с потом образует на поверхности кожи тончайшую водно-липидную мантию - тонкую плёнку, обладающую бактерицидными свойствами, а также смягчает жесткий роговой слой и стержень волоса.
- Патология сальных желез: себорея (гиперфункция при угревой болезни), гипофункция (ихтиоз), стафиллококковое поражение (глубокие фолликулиты, фурункулы)

Волосы.

- Всего у человека насчитывается около 5 млн волосяных фолликулов, в том числе на волосистой части головы - 1 млн.
- ▶ Различают длинные (волосистая часть головы), щетинистые (брови, ресницы, волосы ушных раковин, лобка) и пушковые (поверхность тела) Часть волоса, заложенная в коже, называется корнем, над поверхностью кожи — стержнем. Корень волоса заканчивается шишковидным утолщением - волосяной луковицей.

▶В нижний полюс луковицы проникает сосочек, кровоснабжающий и инервирующий волос. Корень волоса состоит из мозгового и коркового вещества. Поверхностная часть коркового вещества — кутикула, состоит из плоских ороговевающих клеток. Рост волоса происходит из волосяной матрицы - эпителиальных клеток луковицы, заложенных в сосочке.

▶ Патология волос: отсутствие пигмента (седина), выпадение волос (алопеция и диффузное поредение волос), поражение волос грибами (микозы в/ч головы), наследственная патология волос(монилетрикс, синдром " нерасчёсывающихся волос" и др.)

Ногти.

Состоят из кератина. Растут из ногтевого матрикса, расположенного под ногтевым валиком. Матрикс состоит из эпидермиса без зернистого слоя. Небольшая часть корня ногтя, выступающая в виде полулунной белой полоски, называется луночкой ногтя. Полная смена ногтей на ступнях происходит за 90-120 дней, на кистях - за 60-80.

▶ Патология ногтей: наследственные дистрофии ногтей, приобретённые ониходистрофии (при псориазе, хронической экземе и др.), грибковое поражение ногтей (онихомикозы)

Функции кожи

- Защитная
- Иммунная
- Рецепторная
- Терморегулирующая
- Обменная
- Резорбционная

- Секреторная
- Дыхательная


Патогистология кожи в эпидермисе

- Патогистологические процессы в коже, возникающие при различных дерматозах, складываются из определенных гистологических изменений. В эпидермисе наблюдаются следующие патоморфологические изменения.
- АКАНТОЗ. Увеличение числа клеток шиповатого слоя с удлинением эпидермальных гребешков и дермальных сосочков (истинный акантоз - псориаз) или утолщение этого слоя за счет отёка (псевдоакантоз - воспаление или раздражение).

- ► АНАПЛАЗИЯ. Атипия ядер эпителиальных клеток, характеризующаяся увеличением их размеров и гиперхроматозом (злокачественные опухоли).
- ГИПЕРКЕРАТОЗ.
 Утолщение рогового слоя (авитаминоз витамина "А", ихтиоз, хронические воспалительные процессы).



Гиперкератоз



ПАРАКЕРАТОЗ. Неполное ороговение, в клетках рогового слоя сохраняются ядра и цитоплазма. Последняя под влиянием воздуха высыхает и обуславливает выраженное шелушение (псориаз, парапсориаз, розовый лишай, экзема).

ДИСКЕРАТОЗ. Образование рогового слоя, наблюдающееся в местах не свойственных ороговению (бородавки, раки кожи -эритроплазия Кейра, болезнь Педжета).





- ►ГИПЕРЭЛАИДОЗ. Утолщение блестящего слоя (ихтиоз, порокератоз Мибелли).
- ► ГРАНУЛЁЗ. Увеличение числа рядов зернистого слоя (красный плоский лишай).

Патогистология в дерме

- ▶ 1. Гранулёма. Скопление клеток при хроническом пролиферативном воспалении или вокруг возбудителя (туберкулёз, сифилис, лепра)
- Трануляционная ткань. Заполнение, как правило, язвенного дефекта вновь образованной соединительной тканью (рубец)



- Гистологические механизмы формирования полостных элементов
- ▶ 1. СПОНГИОЗ. Межклеточный отёк клеток шиповатого слоя. Серозная жидкость в межклеточных контактах расширяет промежутки между клетками, что приводит к разрыву десмосом и образованию многокамерных пузырьков (дерматиты, экзема, дисгидроз).



▶ ВАКУОЛЬНАЯ ДЕГЕНЕРАЦИЯ.

Внутриклеточный отёк базальных клеток. В их цитоплазме появляются вакуоли, оттесняющие ядро к периферии, в крайнем проявлении – образование субэпидермальных пузырей (красная волчанка).



▶ БАЛЛОНИРУЮЩАЯ ДЕГЕНЕРАЦИЯ.


Резко выраженный отёк эпидермоцитов и разрушение межклеточных мостиков, в результате чего развивается ограниченный акантолиз с образованием пузырей, в которых свободно плавают дис-

трофически измененные эпидермоциты (вирусные дерматозы

- простой и опоясывающий герпес).

- АКАНТОЛИЗ. Потеря связи между шиповатыми клетками, в результате чего появляются щели и внутриэпидермальные пузыри (акантолитическая пузырчатка, импетиго и др.).
- ЭПИДЕРМОЛИЗ. Разрыв якорных тонофиламентов базальных клеток, результатом чего является образование субэпидермальных пузырей (герпетиформный дерматоз Дюринга, неакантолитическая пузырчатка, токсический эпидермонекролиз Лайелла, врожденный буллёзный эпидермолиз).







Семиотика кожных болезней

- 🔲 Первичные морфологические элементы
 - Пятно.
 - 2. Папула
 - з. Бугорок
 - **4.** Узелі
 - Волдырь
 - в. Пузыры
 - Пузырек
 - Гнойничок

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СЫПИ

Первичные элементы. Элементы сыпи, появившиеся впервые, на неизменённой коже.

- Различают инфильтративно-пролиферативные и экссудативные первичные элементы.
- К первым относят: пятно, папулу, бугорок, узел. К экссудативным – волдырь, пузырёк, пузырь, гнойничёк.

▶ Пятно. Ограниченное изменение цвета кожи, обусловленное отложением или отсутствием пигмента (веснушки, витилиго, лейкодерма и т.д.), ограниченным расширением сосудов кожи (сосудистые пятна – розеола, эритема), выходом форменных элементов крови за пределы сосудов (геморрагические пятна – кровоизлияния), искусственным введением пигмента (татуировки).



▶ Папула (узелок).

Первичный инфильтративно-пролиферативный элемент, залегающий в эпидермисе или между эпидермисом и дермой. Эволюция – рассасывание бесследно или с образованием вторичного пигментного пятна (псориаз, дерматиты, красный плоский лишай и др.)



Бугорок. Пролиферативный элемент (размер до горошины), залегающий в сетчатом слое дермы. Эволюция – некротизация с образованием язвы и в дальнейшем рубца или рассасывание с формированием рубцовой атрофии кожи (4L)




⊳Узел.

Пролиферативный элемент (размер от горошины до кулака и более), залегающий в подкожно-жировой клетчатке. Эволюция аналогична бугорковой (глубокий васкулит, грибовидный микоз)



- Экссудативныеэлементы.
- Волдырь. Ограниченный (бесполостной) отёк эпидермиса и сосочкового слоя дермы (укусы насекомых, крапивница и т.д.). Существует от нескольких минут до нескольких дней, исчезает бесследно.



► Пузырёк. Полостной элемент, размером до 5 миллиметров, имеющий покрышку, дно и экссудат. После вскрытия покрышки образуется эрозия (дерматиты, экзема и т.д.)



► Пузырь. Отличается от предыдущего элемента размером (от 0,5 см до десяти и более см) и гистологическим механизмом формирования (см. выше). Наблюдаются при пузырчатке, дерматозе Дюринга и т.д.



► Пустула (гнойничёк).

Первичный полостной элемент с гнойным экссудатом. Может быть поверхностным (образование пустулы в подроговом слое эпидермиса – стрептококковая фликтена) или глубоким – фолликулярным (остиофолликулиты, фолликулиты, фурункулы и т.д.). Поверхностный элемент разрешается бесследно или с образованием корок, глубокий язвы и рубца.





Семиотика кожных болезней

- Вторичные морфологические элементы
 - Вторичное пятно:
 - 2. Чешуйка
 - з. Корка
 - Эрозия
 - <u>5.</u> Язваі
 - Ссадина.
 - Трещина
 - Лихенизация
 - Вететация
 - Рубеці

Образуются при эволюции из первичных морфологических элементов.

▶ 1. Вторичное пигментное пятно. Является временным исходом папул, эрозий, геморрагий и т.д.



▶2. Чешуйка.

Отторгающаяся роговая пластинка. В зависимости от размера обуславливает определенный вид шелушения: отрубевидное (кератомикозы), пластинчатое (псориаз), крупнопластинчатое (листовидное) — эритродермии

▶ 3. Корка. Представляет собой ссохшийся экссудат полостных элементов или эрозивноязвенных дефектов. В СВЯЗИ С ЭТИМ КОРКИ могут быть гнойными, серозными или геморрагическими.



▶ 4. Ссадина (экскориация). Линейный дефект кожи вследствие механического травмирования, в том числе расчесами. В зависимости от глубины травмирования исходом экскориаций могут быть образование рубцов или бесследное исчезновение. Элемент характерен для зудящих дерматозов (чесотка, атопический дерматит, кожный зуд и т.д.) или патомимии



Трещина. Представляет собой линейный дефект кожи, образовавшийся вследствие

- 1).потери эластичности кожи на фоне сухости (ихтиоз, хроническая экзема и т.д.)
- 2).на фоне мацерации (микоз стоп, кандидоз складок и т.д.).



▶ 6. Эрозия. Дефект кожи в пределах эпидермиса, возникающий на месте ПОЛОСТНЫХ элементов (пузырёк, пузырь) или механического травмирования на фоне мацерации (мокнущие эрозивные папулы вторичного периода сифилиса) Эволюция – бесследное исчезновение или формирование временного вторичного пигментного пятна.



Язва. Дефект кожи в пределах дермы или подкожно-жировой клетчатки.

Является следствием эволюции глубоких пролиферативных элементов (бугорок, узел), глубоких пустул. Исход — всегда рубец



Рубец. Вновь образующаяся соединительная ткань, замещающая глубокий дефект кожи (как правило, язвенный). В зависимости от соотношения к поверхности здоровой кожи различают нормотрофические рубцы (не возвышающиеся над уровнем кожи), атрофические (западающие), гипертрофические (келлоидные – возвышающиеся).



Вегетация. Разрастание эпидермиса и сосочкового слоя дермы (+ткань) вследствие раздражения эрозивных участков или при дерматозах вирусной природы. Наблюдается при бородавках, вегетирующей пузырчатке, кондиломах и т.д.



Лихенификация. Огрубение, утолщение всех слоев кожи, развивающееся вследствие длительного механического травмирования расчесами (атопический дерматит, хроническая экзема) или наследственного избыточного ороговения (ихтиоз и т.д.).



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!