


Методы функциональной и клинической биохимии


Курс лекций кафедры фундаментальной медицины и биологии ВолгГМУ для направления подготовки: 06.03.01 «Биология», профиль Биохимия (уровень бакалавриата)



ЛЕКЦИЯ №8:


Ацидоз. Алкалоз.

Клиническое значение. Методы оценки



**Под кислотно-основным
состоянием (КОС)**

подразумевается соотношение
концентраций ионов водорода
(H^+) и гидроксильных (OH^-)
ионов в биологических
жидкостях



Теория Бренстеда

- ▶ Кислота – это молекула или ион диссоциирующие с образованием протона



- ▶ Основание – это молекула или ион способные связывать протон






кислота

сопряженное
основание


- ▶ Сильная кислота $\leftrightarrow$ слабое сопряженное основание
- ▶ Слабая кислота $\leftrightarrow$ сильное сопряженное основание



H_2O – слабая кислота



$$K_{\text{дисс}} = \frac{[\text{H}^+] + [\text{OH}^-]}{\text{H}_2\text{O}} = 1 \times 10^{-14} \text{ моль/л}$$



Нормальное значение рН крови 7,34-7,44

Предельные значения рН, совместимые с жизнью

для взрослых 6,7-6,8 – 7,7-7,8


**для детей рН 6,75 (граница обратимости
физиологических реакций)**

рН 6,4 несовместимо с жизнью



Регуляция кислотно-основного состояния осуществляется:

- ▶ **буферными системами крови** (действие через 15-30 мин) **и тканей** (действие через 2-6 часов) – действие которых заключается в замене сильных кислот и оснований на слабые;
- ▶ **физиологическими системами почек, легких, печени, ЖКТ**- уравнивают скорость выведения кислотных и щелочных компонентов с темпами их образования (путем изменения концентрации компонентов буферных систем)



Буферные системы организма

- ❖ бикарбонатный буфер

$\text{H}_2\text{CO}_3 / \text{Na}^+\text{HCO}_3^-$ (1/20), БЕ – 18 мэкв H^+ /л крови

- ❖ фосфатный буфер


$\text{Na}^+\text{H}_2\text{PO}_4^- / \text{Na}_2^+\text{HPO}_4^{2-}$ (1/4), БЕ – 0,3 мэкв H^+ /л крови

- ❖ белковый буфер

$\text{HPr} / \text{Na}^+\text{Pr}^-$ БЕ – 1,7 мэкв H^+ /л крови

- ❖ гемоглобиновый буфер

$\text{HHbO}_2 / \text{K}^+\text{HbO}_2^-$; $\text{HHb} / \text{K}^+\text{Hb}^-$
БЕ – 8,0 мэкв H^+ /л крови



Буферные системы


- ▶ *Буферным действием обладают растворы, содержащие слабую кислоту и ее соль с сильным основанием*

Пример: H_2CO_3 кислота дыхательный компонент
 $\text{Na}^+\text{HCO}_3^-$ основание метаболич. компонент

1. Добавим сильную кислоту (H^+)




1. Добавим сильное основание (OH^-)



Бикарбонатный буфер – основной буфер плазмы крови




Открытый буфер: концентрация летучей H_2CO_3 , находящейся в равновесии с pCO_2 регулируется легкими, концентрация $\text{Na}^+\text{HCO}_3^-$ - регулируется почками и др. органами системами (ЖКТ)




Механизмы органной компенсации (изменение концентрации компонентов буферных систем крови)

- ▶ **Легочная** - *контроль уровня CO_2 (и соответственно H_2CO_3 в крови)*
начало через 2 часа,
максим. эффективность – 6-8 часов
- ▶ **Почечная** - *контроль уровня H^+ и HCO_3^- в крови*
начало через 6-8 часов,
максим. эффективность – 3-6 суток
- ▶ **Печеночная** - *контроль уровня H^+*
- ▶ **ЖКТ** - *влияние на уровень H^+ , HCO_3^- и электролитов крови (K^+ , Na^+ , Cl^-)*




Связь водно-электролитного обмена и КЩС

- ▶ Реализуется через закон электронейтральности
- ▶ Компоненты буферных систем – ионы, изменение их концентрации должно быть уравновешено изменениями ионов аналогичного знака: ***изменение HCO_3^- как правило сопровождается изменением Cl^- ; изменение H^+ - изменением K^+ и т.д.***




Нормальные показатели КОС венозной и артериальной крови (традиционные значения)

Параметр	Сим-вол	Значение в/а	Диапазон	Единицы измерения
pH	pH	7,37 / 7,40	7,32-7,42 / 7,35-7,45	
Парциальное напряжение CO₂	P_в\aCO₂	48 / 40	42-54 / 35-45	мм рт.ст.
Base exces	BE	0	От -2,3 до +2,3	ммоль/л
Общая CO₂ (HCO₃⁻ + Pa CO₂·0,03)	TCO₂	29 / 25	26-32 / 23-27	ммоль/л
HCO₃⁻ (AB)	HCO₃	24	22-26	ммоль/л
Стандартный бикарбонат	SBC	24	22-26	ммоль/л
Сатурация O₂	SHvO₂	60 / 96	50-70 / 92-98	%
Парциальное напряжение O₂ PaO₂=104 - 0,27×возраст	P_в\aO₂	40 / 95	37-42 / 85-100	мм рт. ст.




Нарушения КОС

- ▶ Ацидозы – появление в крови абсолютного или относительного избытка кислот ($\uparrow [\text{H}^+]$, $\downarrow \text{pH}$)
- ▶ Алкалозы – появление в крови абсолютного или относительного избытка оснований ($\downarrow [\text{H}^+]$, $\uparrow \text{pH}$)



По степени компенсации:

		Ацидозы	Алкалозы
▶ Компенсированные	(в)	7,32–7,37	7,37–7,42
	(а)	7,35–7,40	7,40–7,45
▶ Субкомпенсир.	(в)	7,22–7,31	7,43–7,52
	(а)	7,25–7,34	7,46–7,55
▶ Декомпенсир.	(в)	7,21 и <	7,53 и >
	(а)	7,24 и <	7,56 и >




По длительности течения

- ▶ Острые – часы – 2–3 суток
- ▶ Подострые – 4 суток – 1 месяц
- ▶ Хронические – > 1 месяца



По механизму развития:


- ▶ Респираторные
- ▶ Метаболические



Респираторный ацидоз

- ▶ В основе лежит гиперкапния – $\uparrow p\text{CO}_2$ и соответственно H_2CO_3 в крови:

$\uparrow p\text{CO}_2$ на **10** мм.рт.ст. $\Rightarrow$ pH $\downarrow$ на **0,08**
(при острых РАЦ)



Причины респираторного ацидоза

Обструкция дыхательных путей

- ▶ Хроническая обструктивная болезнь легких (например бронхит, эмфизема)
- ▶ Бронхоспазм (например астма)
- ▶ Аспирация

Угнетение дыхательного центра

- ▶ Анестетики
- ▶ Седативные препараты
- ▶ Черепно-мозговая травма
- ▶ Опухоли

Нейромышечные расстройства


- ▶ Полиомиелит
- ▶ Синдром Гийена-Барре
- ▶ Амиотрофический боковой склероз (болезнь двигательных нейронов)
- ▶ Тетанус, ботулизм
- ▶ Нейротоксины, кураре

Заболевания легких

- ▶ Фиброз легких
- ▶ Тяжелая пневмония
- ▶ Респираторный дистресс-синдром

Нелегочные торакальные заболевания

- ▶ Тяжелый кифосколиоз
- ▶ «Болтающаяся» грудная клетка




Компенсируется:

Острые

- ▶ Одышка ($\uparrow$ скорости выведения CO_2 , высвобождение тканевых буферов – HCO_3^-)
 $\uparrow \text{pCO}_2$ на 10 мм.рт.ст. $\Rightarrow \uparrow \text{HCO}_3$ на 1 мэкв/л

Хронические

- ▶ Почечная компенсация (задержка $\text{Na}^+\text{HCO}_3^-$):
 $\uparrow \text{pCO}_2$ на 10 мм.рт.ст. $\Rightarrow \uparrow \text{HCO}_3$ на 3,5 мэкв/л
Начало – 6–8 часов, max – 3–5 сутки




Респираторный ацидоз

1. вена

pH	pO₂	BE	BB	SB	pCO₂	AB
7,30	38	+ 8,5	53	26,5	75	36


2. вена

pH	pO₂	BE	BB	SB	pCO₂	AB
7,04	44	- 10	37	16	95	26



Клиника:

- ▶ 1. Тахипное, синдром углекислого наркоза при $p\text{CO}_2 \uparrow 60$ мм.рт.ст. $\downarrow p\text{O}_2 \Rightarrow$ является стимулятором ДЦ, если $p\text{O}_2 \uparrow > 75$ мм.рт.ст., то ДЦ перестает реагировать.
- 2. Угнетение ЦНС (летаргия, спутанность сознания вплоть до глубокой комы)
- 3. Гипер K^+ емия, аритмия
- 4. Нестабильный уровень АД, гипотензия



Респираторный алкалоз

- ▶ В основе лежит гипокапния – $\downarrow$ $p\text{CO}_2$ и соответственно H_2CO_3 в крови:

$\downarrow$ $p\text{aCO}_2$ на **10** мм.рт.ст. $\Rightarrow$ $p\text{H}$ $\uparrow$ на **0,08**
(при острых РАлк)



Причины респираторного алкалоза

Гипоксия


- ▶ Высокогорье
- ▶ Тяжелая анемия
- ▶ Заболевания легких

Усиленная стимуляция дыхания

- ▶ Стимуляторы дыхания (например салицилаты)
- ▶ Церебральные нарушения (например травма, инфекция, опухоли)
- ▶ Печеночная недостаточность
- ▶ Грамотрицательная септицемия
- ▶ Синдром первичной гипервентиляции
- ▶ Принудительная гипервентиляция

Заболевания легких

- ▶ Отек легких
- ▶ Легочная эмболия



Компенсируется:

Острый

- ▶ высвобождение тканевых буферов, почечная компенсация

↓ $p\text{CO}_2$ на 10 мм.рт.ст. $\Rightarrow$ ↓ HCO_3 на 2 мэкв/л

Хронический

- ▶ Почечная компенсация (выведение $\text{Na}^+\text{HCO}_3^-$):

↓ $p\text{CO}_2$ на 10 мм.рт.ст. $\Rightarrow$ ↓ HCO_3 на 5 мэкв/л

Начало – 6–8 часов, max – 3–5 сутки




Респираторный алкалоз

1. вена

pH	pO2	BE	BB	SB	pCO2	AB
7,46	52	- 5,0	40,2	20	25	17,4


2. вена

pH	pO2	BE	BB	SB	pCO2	AB
7,57	76	+ 3,4	52,4	27,4	23,2	26



Клиника:


1. Психические расстройства при $\uparrow \text{pH} > 7,54$
2. Ухудшение снабжения кислородом тканей (нарушение диссоциации HbO_2)
3. Тетания, парестезии (снижение Ca^{+})
4. Гипо K^{+} емия, предсердные и желудочковые тахикардии



Метаболический ацидоз

- ▶ В основе лежит накопление нелетучих кислот или $\downarrow \text{HCO}_3^-$ в крови:

$\downarrow \text{HCO}_3^-$ на **10** мэкв/л $\Rightarrow$ pH $\downarrow$ на **0,15**
(при острых МАц) $\downarrow$



Основные причины нереспираторного (метаболического) ацидоза

Увеличенное образование H^+

- ▶ Кетоацидоз (обычно диабетический или алкогольный)
- ▶ Лактат-ацидоз
- ▶ Отравление (например этанолом, метанолом, этиленгликолем, салицилатами)
- ▶ Наследственный органический ацидоз

Поступление кислот внутрь

- ▶ Отравление кислотами
- ▶ Избыточное парентеральное введение аминокислот (например аргинина, лизина, гистидина)




Сниженная экскреция H^+

- ▶ Почечный канальцевый ацидоз
- ▶ Выраженная почечная недостаточность
- ▶ Ингибиторы карбоангидразы

Потеря бикарбоната

- ▶ Диарея
- ▶ Фистулы и дренирование поджелудочной железы, кишечника, желчного пузыря



Компенсируется:

Острый

- ▶ Быстрое развитие гипервентиляции
при $\downarrow$ HCO_3^- на 1 мэкв/л $\Rightarrow$ $\downarrow$ pCO_2 на 1,2 мм.рт.ст.

Хронический


- ▶ Гипервентиляция
- ▶ Почечная компенсация (задержка $\text{Na}^+\text{HCO}_3^-$):
Начало – 6–8 часов, max – 3–5 суток



Метаболический ацидоз

1. вена

pH	pO₂	BE	BB	SB	pCO₂	AB
7,17	65	- 19	25	9,8	22	7,8



Клиника:

1. Тахипное
2. Угнетение ЦНС (летаргия, спутанность сознания вплоть до глубокой комы)
3. ГиперK⁺емия, аритмия
4. Нестабильный уровень АД, гипотензия
5. Влажная холодная кожа
6. При хр. МАц. Слабость, анорексия, недомогание (при ХПН наиболее часто)



Метаболический алкалоз

- ▶ В основе лежит избыточное образование или накопление HCO_3^- в крови:

↑ HCO_3^- на 10 мэкв/л ⇒ рН ↑ на 0,15
(при острых МАлк) ↓



Причины метаболического алкалоза

Потеря незабуференных ионов водорода (ионов K^+ , Cl^-)

Через желудочно-кишечный тракт:

- ▶ рвота и стеноз привратника
- ▶ врожденная диарея с потерей ионов хлора

Через почки:

- ▶ избыток минералокортикоидов:
 - синдром Конна
 - синдром Кушинга
- ▶ лекарства с активностью минералокортикоидов (например карбеноксолон)
- ▶ лечение диуретиками (без сохранения ионов K^+)
- ▶ быстрая коррекция хронически повышенного pCO_2
- ▶ обеднение организма калием

Введение щелочей

- ▶ неправильное лечение ацидоза
 - ▶ хроническое поступление щелочей внутрь
- 


Компенсируется:

Острый

- ▶ Быстрое развитие гиповентиляции
при $\uparrow \text{HCO}_3^-$ на 1 мэкв/л $\Rightarrow \uparrow \text{pCO}_2$ на 0,7 мм.рт.ст.

Хронический


- ▶ Гипервентиляция
- ▶ Почечная компенсация (выведение $\text{Na}^+\text{HCO}_3^-$):
Начало – 6–8 часов, max – 3–5 сутки



Метаболический алкалоз


1. вена

pH	pO₂	BE	BB	SB	pCO₂	AB
7,51	26	+ 13	60	36	59	39




Клиника:

1. Ухудшение снабжения кислородом тканей (нарушение диссоциации HbO₂)
2. Тетания, парестезии (снижение Ca⁺)
3. ГипоK⁺емия, предсердные и желудочковые тахикардии
4. Психические расстройства при $\uparrow \text{pH} > 7,54$



Компенсация нарушений КОР крови

	Респираторный алкалоз	Респираторный ацидоз
Первичные нарушения	$< p\text{CO}_2$	$> p\text{CO}_2$
Компенсаторный ответ	$< \text{HCO}_3$	$> \text{HCO}_3$
Расчет предела компенсации Острый	при $< p\text{CO}_2$ на 10 мм рт. ст., $\text{HCO}_3 < \text{на } 2 \text{ мэкв/л}$	при $> p\text{CO}_2$ на 10 мм рт. ст., $\text{HCO}_3 > \text{на } 1 \text{ мэкв/л}$
 Хронический	при $< p\text{CO}_2$ на 10 мм рт. ст., $\text{HCO}_3 < \text{на } 5 \text{ мэкв/л}$	при $> p\text{CO}_2$ на 10 мм рт. ст., $\text{HCO}_3 > \text{на } 3,5 \text{ мэкв/л}$



Основные механизмы коррекции нарушений КОС


Нарушение	Изменение рН	Компенсаторный ответ	Результат компенсации
Дыхательный ацидоз			
Острый	рН ↓ на 0,08 на каждые 10 мм рт. ст.	Немедленное высвобождение тканевых буферов (HCO_3^-)	↑ HCO_3^- на 1 мэкв/л при ↑ Ра CO_2 на каждые 10 мм рт.ст. от исходного значения
Хронический	Зависит от степени почечной компенсации; часто близко к нормальным значениям	↑ почечной реабсорбции HCO_3^- ; клинически обнаруживается через 8 ч; максимальный эффект развивается в течение 3-5 суток	↑ HCO_3^- на 3,5 мэкв/л при ↑ Ра CO_2 на каждые 10 мм рт. ст.
Дыхательный алкалоз			
Острый	рН ↑ на 0,08 на каждые 10 мм рт. ст. ↓ Ра CO_2	Немедленное высвобождение тканевых буферов	↓ HCO_3^- на 1 мэкв/л при ↓ Ра CO_2 на каждые 10 мм рт.ст.
Хронический	рН нормализуется при адекватной функции почек	↓ почечной реабсорбции HCO_3^-	Максимальная почечная ком-пенсация ↓ HCO_3^- на 5 мэкв/при ↓ Ра CO_2 на каждые 10 мм рт. ст. Максимальный эффект разви-вается в течение 7-9 сут и мо-жет приводить к нормализации рН

Основные механизмы коррекции нарушений КОС

Нарушение	Изменение рН	Компенсаторный ответ	Результат компенсации
Метаболический ацидоз			
Острый	рН ↓ на 0,15 на каждые 10 мэкв/л ↓ HCO_3^-	Быстрое развитие гипервентиляции	↓ Ра CO_2 на 1,2 мм рт. ст. при ↓ HCO_3^- на каждый 1 мэкв/л
Хронический	рН такой же, как если бы не было дыхательной компенсации	Гипервентиляция	Эффекты гипервентиляции длятся всего несколько суток, так как ↓ Ра CO_2 вызывает дальнейшее ↓ реабсорбции HCO_3^- в почках
Метаболический алкалоз			
Острый	рН ↑ на 0,15 на каждые 10 мэкв/л ↑ HCO_3^-	Быстрое развитие гиповентиляции	↑ Ра CO_2 на 0,7 мм рт. ст. при ↑ HCO_3^- на каждый 1 мэкв/л
Хронический	рН такой же, как если бы была дыхательная компенсация	Гиповентиляция	Эффекты гиповентиляции длятся всего несколько суток, так как ↑ Ра CO_2 вызывает ↑ экскреции H^+ в почках и ↑ HCO_3^- в плазме крови


Ацидоз субкомпенсированный метаболический

- ▶ Вена.
- ▶ pH—7.26
- ▶ pO₂—66
- ▶ BE— -7,5
- ▶ SB— 18,3
- ▶ pCO₂—44
- ▶ AB—19



Алкалоз субкомпенсированный респираторный

- ▶ Вена
- ▶ pH–7,52
- ▶ pO₂–34
- ▶ BE– +3
- ▶ SB–26
- ▶ pCO₂– 30
- ▶ AB–24,5




Ацидоз декомпенсированный смешанный

- ▶ pH–7,08
- ▶ pO₂–32
- ▶ BE– –15
- ▶ SB–12
- ▶ pCO₂–56
- ▶ AB–16
- ▶ вена




Алкалоз декомпенсированный смешанный

- ▶ Артерия
- ▶ pH–7,65
- ▶ pO₂–76
- ▶ BE– +14,5
- ▶ SB–39
- ▶ pCO₂–33
- ▶ AB–37




Ацидоз декомпенсированный респираторный

- ▶ Вена
- ▶ pH–7,11
- ▶ pO₂–62
- ▶ BE–+6,2
- ▶ SB–29,4
- ▶ pCO₂–126
- ▶ AB–40,6



Алкалоз субкомпенсированный метаболический

- ▶ Артерия
- ▶ pH–7,52
- ▶ pO₂–81
- ▶ BE–+11,3
- ▶ SB–35
- ▶ pCO₂–45
- ▶ AB–36,5



Субкомпенсированный смешанный ацидоз (ДОАР)

- ▶ FIO₂ – 30%;
- ▶ pH – 7.251
- ▶ PO₂ – 45.4
- ▶ PCO₂ – 38.0
- ▶ SO₂ – 77.8%
- ▶ iCa – 0.630
- ▶ cHCO₃ – 16.3
- ▶ cHCO₃ ст – 16.4
- ▶ BE – -10.1
- ▶ BB – 36.8



Больной ОРВИТ №2

15.07.2010

- ▶ FIO₂ – 40%;
- ▶ pH – 7.28
- ▶ PO₂ – 42
- ▶ PCO₂ – 42.5
- ▶ SO₂ – 62.2%
- ▶ iCa – 0.493
- ▶ cHCO₃ – 19.6
- ▶ cHCO₃ ст – 18.9
- ▶ BE – -6.7
- ▶ BB – 38.7

Субкомп. ац.
мет. подострый

16.07.2010

- ▶ FIO₂ – 25%;
- ▶ pH – 7.447
- ▶ PO₂ – 54.9
- ▶ PCO₂ – 31.9
- ▶ SO₂ – 88%
- ▶ iCa – 0.695
- ▶ cHCO₃ – 21.5
- ▶ cHCO₃ ст – 22.8
- ▶ BE – -1.9
- ▶ BB – 44.3

Субкомп. алк.
респ.

17.07.2010


- ▶ FIO₂ – 30%;
- ▶ pH – 7.5
- ▶ PO₂ – 37.9
- ▶ PCO₂ – 25.5
- ▶ SO₂ – 65.1%
- ▶ iCa – 0.328
- ▶ cHCO₃ – 19.5
- ▶ cHCO₃ ст – 22.3
- ▶ BE – -2.5
- ▶ BB – 43.7

Субкомп. алк.
респ.

19.07.2010

- ▶ FIO₂ – 30%;
- ▶ pH – 7.51
- ▶ PO₂ – 38.3
- ▶ PCO₂ – 25.5
- ▶ SO₂ – 66%
- ▶ iCa – 0.440
- ▶ cHCO₃ – 20.1
- ▶ cHCO₃ ст – 23.1
- ▶ BE – -1.6
- ▶ BB – 45.1

Субкомп. алк.
респ.



Больная ОРВИТ №1 (16.07.2010)

- ▶ FIO₂ – 21%;
- ▶ pH – 7.313
- ▶ PO₂ – 34,5
- ▶ PCO₂ – 29.4
- ▶ SO₂ –
- ▶ iCa – 0.249
- ▶ cHCO₃ – 14.6
- ▶ cHCO₃ ст – 15.9
- ▶ BE – -10.6
- ▶ BB – 33.7

Субкомпенсированный метаболический
ацидоз



Больной ОРВИТ №1 (19.07.2010)

- ▶ FIO₂ – 40%;
- ▶ pH – 7.36
- ▶ PO₂ – 101
- ▶ PCO₂ – 36.2
- ▶ SO₂ – 97.2
- ▶ iCa – 0.440
- ▶ cHCO₃ – 20
- ▶ cHCO₃ ст – 20.5
- ▶ BE – -4.7
- ▶ BB – 43.6

Компенсированный метаболический
ацидоз



Больной ДОАР

14.07.2010

- ▶ FIO2 – 30%;
- ▶ pH – 7.322
- ▶ PO2 – 42.6
- ▶ PCO2 – 32.4
- ▶ SO2 – 70.7%
- ▶ iCa – 0.716
- ▶ cHCO3 – 16.4
- ▶ cHCO3 ст – 17.5
- ▶ BE – -8.6
- ▶ BB – 37.9

Комп. ац.
мет.

15.07.2010

- ▶ FIO2 – 40%;
- ▶ pH – 7.28
- ▶ PO2 – 49.7
- ▶ PCO2 – 31.9
- ▶ SO2 – 79.2%
- ▶ iCa – 0.718
- ▶ cHCO3 – 14.8
- ▶ cHCO3 ст – 15.9
- ▶ BE – -10.8
- ▶ BB – 34.7

Субкомп. ац.
мет.

16.07.2010


- ▶ FIO2 – 35%;
- ▶ pH – 7.285
- ▶ PO2 – 46.9
- ▶ PCO2 – 31.6
- ▶ SO2 – 75.4%
- ▶ iCa – 0.942
- ▶ cHCO3 – 14.7
- ▶ cHCO3 ст – 16.1
- ▶ BE – -10.6
- ▶ BB – 37.3

Субкомп. ац.
мет.

17.07.2010

- ▶ FIO2 – 35%;
- ▶ pH – 7.226
- ▶ PO2 – 43.6
- ▶ PCO2 – 39.8
- ▶ SO2 – 66.6%
- ▶ iCa – 0.647
- ▶ cHCO3 – 16.1
- ▶ cHCO3 ст – 15.9
- ▶ BE – -10.7
- ▶ BB – 34.6

Субкомп. ац.
мет.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

