

Содержит

Содержит японской пеллы *Sophorae japonicae fructus*

ЛР: Сопора японская *Sophora japonica*

Сем. Бобовые *Fabaceae*

Живи состав: флавоноиды (рутин, кверцетин, кемпферол) - 3-сорорид

Применение: кожные, витаминные препараты как биостимуляторы, иммуностимуляторы ср-во

(52) Стадия ЛРС, обратного флавоноиды (II)

11.09.2020

Задание 1 Бессмертника печального убажи


*Helichrysum aeneum*

ЛР: Бессмертник печальный *Helichrysum aeneum*


Сем. Астровые *Asteraceae*



Антракилин R = H



Антрахинон R = OH



Викетин R = H

Ориентин R = OH

Стандарт сульфид флавоноидов в персикте на рутин - не менее 1%, полисахаридов - не менее 2%.

Применение: как отхаркивающее и слабительное в виде чая настоя.

Родство: Фрукты черноплодной сливы - *Prunus melanocarpa* *seeds fructus*

Фрукты черноплодной сливы - *Prunus melanocarpa* *seeds fructus*

Фрукты черноплодной сливы - *Prunus melanocarpa* *seeds fructus*

Внешние признаки: черноплодная слива - плоды желтые, твердость бумажная

Внутренние признаки: витаминность, рутин, кверцетрин

Стандарт сульфид флавоноидов в персикте на рутин - не менее 1%, полисахаридов - не менее 2%.

Применение: как отхаркивающее, слабительное, рутин