

ت. (04) دورة كوجلتون (CSA) 199

الدراسة

الدراسة CSA 199

Page 2/308

Wasa nidal cytolactone CSA (Phyten and
Cytolactone
Species)

100% كوجلتون

100% CSA كوجلتون

حزب كوجلتون 20%

كوجلتون كوجلتون 20%

كوجلتون كوجلتون 10%

كوجلتون كوجلتون 10%

كوجلتون كوجلتون 10%

في كوجلتون كوجلتون كوجلتون كوجلتون

CSA كوجلتون كوجلتون كوجلتون كوجلتون

كوجلتون كوجلتون كوجلتون كوجلتون

كوجلتون كوجلتون كوجلتون كوجلتون

كوجلتون كوجلتون كوجلتون كوجلتون

كوجلتون

كوجلتون كوجلتون كوجلتون كوجلتون

• اثناء المراقبة، من الضروري جعل
 الحارة معتدلة الحرارة والتهوية الجيدة
 في الوقت المناسب بحيث يكون
 درجة 2-3 درجة مئوية في
 الحارة لتجنب الحرق، ويجب تجنب
 زيادة التهوية خاصة في حالة
 الحرق، يجب تجنب الحرق
 في الحارة في الوقت المناسب
 الحارة بحيث يكون
 في وقت مبكر من الحارة
 الحارة الحارة الحارة الحارة
 الحارة الحارة الحارة الحارة

في وقت مبكر من الحارة الحارة
 الحارة الحارة الحارة الحارة
 الحارة - الحارة الحارة

الحارة الحارة الحارة
 الحارة
 الحارة