⑧ Лимонник Китайский
lat. Schisandra chinensis
сем. Лимонниковые lat. Schisandraceae

② Бот. описание
Листопадные лианы до 10-15 м в сырых районах растения вырастают в длину 4 м.
Листья эллиптические или обратнояйцевидные длиной 5-10 см имеют хлопьевидное основание и заострённую вершину.
Цветки - раздельнополые растения. А некоторые виды на выше могут быть только мужские цветки. Образуются из 6-9 долей из них наружные покрывка.
Формула цветка - ♂ *P3+3 +3A∞ G0 Q* + P+3+3A0 G0
перед цветением - почки прикрываются чешуйками

③ произрастает в Корее, Китае, Японии, Российском Дальнем Востоке в приморье.

ARARAWI

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Хат самбар

Всех видов сад. сорта до 4,5% органических кислот (2,5 - 2а) небольшое содержание дубильных (0,82а) большой сахаристости мало пектина около 0,02% и содержание минеральных (0,03) не превышало 34%.

Применение

Из них сорта можно использовать приготовления 13,6 кг пюреобразной 21,3 кг сок для бродильных баз.

* Кст. Ле Шатлерон хлеб выращивается зимостойкости средне высокие закладка для получения сока анле спокеннт жонкин обеи обязательно сразу 5-8 дней после сбора или 8 суток при Т. 50 - 60С°

* Малина обыкновенная (лат. Rubus idaeus) сем. Розовые (Rosaceae) лат.

* Листопадный кустарник с многолетней корневой системой которого ежегодно вырастают новые стебли высотой 1,5 - 2,5 м, которые чередуются плодоносящими и бесплодными.
стебель прямостоячие полые покрытые густо шипами. Цветки - обоеполые образуют 3-7 лучевые щитки. Завязь апокарпная. В пыльнике, созревает в первые дни сентября. Плоды многосемянные собираются вручную.

Хат. самб.

Со плодов сад. до 11% сахара (глюкоза, фруктоза) сладкие, содержание кислоты С, А, В 1-2% органические в-ва сухого (белки, пектины) ароматные ценная сорта сад. до 2% жирного масла

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

* Заготовка сырья
Сырьем для обработки служат в среднем 6 лет обработанные плодовые тела, которые собирают в фазе полного созревания. Высушенное сырье должно иметь запах грибов, вкус горьковатый. Хранят сушат сырье при температуре 50-60°С. Хранение на производстве.

* Химический состав. При разрезании плодовых тел выделяется жидкость, которая сначала бесцветная, затем становится красной, а на воздухе и при добавлении фенолсодержащих веществ становится красно-коричневой.

* Применение - лекарственный препарат. Применяется при ревматизме, подагре, отеках, при заболеваниях почек, мочевого пузыря, при гипертонической болезни.

* Марена грузинская Lon. (Rubia iberica Fisch)
Сем. Мареновые - Lon. Rubiaceae

* Ботаническое описание
Многолетнее травянистое растение. Стебли лежачие, опушенные, реже слабые, чаще красные, с отогнутыми назад колючками. Корни красно-коричневые, толщиной 2-3 мм, с ветвями - хорошо развитые, расположены в виде розетки. Листья в мутовках по 4-6 шт., с колючками. Цветки мелкие, собраны в метелки.

* Заготовка - сырье от декоративных растений заготавливают ранней весной, скашивают заросли на одних и тех же площадях через год в 2-3 раза в сарах и лощинах. В лесных зарослях через 4-5 лет. Сушат при температуре 50-60°С.

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner