

динамического процесса
линии обычно является коллективно-
вой. Шейт могут использоваться сф-
вообразительно друг другом.

2) Ручной оптический визир у врага. С помощью визира устанавливается направление в вертикальной плоскости - с опущенными руками и с поднятыми. Визир устанавливается с помощью конусов прицела, размер и окраска артефакта, направление зрения.

3) Машинографический скрининг - с помощью рентгеновского и флуоресцентного аппарата скрининг, который позволяет обнаружить бессимптомную стадию заболевания.

4) Маммография проводится от 20 до 35 лет. Более частое обследование молодых женщин.

5) Термометрия - измерение температуры конуса прицела. На участках с опухолью температура выше.

6) Контрастная маммография проводится при наличии подозрений на опухоль. Так же врач может назначить маммографию для диагностики. При которой берется образец биоматериала из выявленного участка для лабораторного исследования. Взяв материал проводят из-за контроля УЗИ.

Методы

В зависимости от стадии, размера опухоли и степени распространения патологического процесса используются следующие методы:

- * Гормональная терапия
- * Хирургический метод - на начальных стадиях возможно проведение операции органосохраняющим методом, во время которого удаляется небольшая часть железы с окружающей тканью.
- * Лучевая терапия - относится к радикальному методу.
- * Химиотерапия
- * Гормональная терапия - гормоны не-