

Рак желудка

Норманов Э. С.
2 гр. 5 кв, отработка

1) Особенности возникновения рака желудка:

- диета с избытком нитратов и недостатком клетчатки
- преобладание пищи углеводов, при недостатке витаминов и микроэлементов
- химический состав пищи и воды в районе обитания человека
- дуоденогастральный рефлюкс, выработка желудочной кислоты, образование канцерогенных веществ типа нитрозаминов.
- продукция реактивных свободнорадикальных окислителей
- наследственная восприимчивость
- бактерии *H. pylori*

2) Предраковые заболевания, факторы риска

- хронический гастрит
- аденоматозные полипы
- хроническая язва желудка
- резектированный желудок
- болезнь Менетрие

3) Патоморфозы

Критерии гистоморфологических изменений рака:

- Полиповидный и грибовидный отграниченный рак с экзотрофным ростом
- Чашевидный и блюдцеобразный рак с четко концентрированными границами и ба микробразно приподнятыми краями, который рассматривается как дескриптивная фаза полиповидного рака
- Язвенно-инfiltrативный, язвенно-инfiltrативный язвенноподобный рак, как и которого не отделяется резкими границами от окружающей

его менструальной смени.

Диффузный рак, характеризующийся утолщением всей слизистой шейки матки.

Международная классификация, согласно которой выделены:

- аденокарциномы: папиллярная, муцилярная, слизистая или муцинозная
- перстневидно-клеточный рак
- недифференцированный рак
- железисто-клеточный рак
- плоскоклеточный рак
- неклассифицируемый рак

-) Ранний рак шейки матки

Относятся:

- 1) поражение слизистой оболочки шейки матки без инвазии в подслизистый слой и без метастазирования в регионарные лимф. узлы
- 2) инвазивный рак (малышизация) в полость
- 3) инвазивный рак (малышизация) в хронической язве шейки матки.

Классификация Якобского эндоскопического общества:

- Тип I - выбухающий или приподнятый
- Тип II - поверхностный рак
- Тип III - подрытый, язвенный

-) Метастазирование. Стадии рака шейки матки:

Рак шейки матки метастазирует тремя путями:

- 1) лимфогенно
- 2) гематогенно
- 3) имплантационно или контактно
брюшине

- Международная классификация по системе TNM
- T - первичная опухоль
 - N - регионарные лимфатические узлы
 - M - отдаленные метастазы

- Сложности рака желудка:
- 1) обусловленные смежизирующим действием первичной опухоли
 - 2) вызванные распадом и изъязвлением первичной опухоли
 - 3) преимущество метастазов
 - 4) вызванные местным воздействием метастазов опухоли
 - 5) метастатические
 - 6) тромбоэмболические
 - 7) смешанная группа

- Клиника:
- Малоблы можно разделить на две группы:
- узелковые брыжеечные
 - гастрогенные малоблы

- Три клинических варианта:
- латентный
 - безболезненный
 - - с болями синдромом

- Диагностика:
- желудочное содержимое
 - исследование крови
 - рентгенологическое и эндоскопическое исследование с взятием биоптатов.

- Лечение:
- - хирургическое
 - лучевое
 - химиотерапия
 - комбинированное

- Субтотальная дистальная резекция
- Субтотальная проксимальная резекция желудка
- Гастрэктомия - полное удаление желудка
- Гастроэнтеростомия
- Гастростомия
- Энтеростомия