

Отработка протокола 21.10.21

Шевченко Мария 216 пер

16.12.21

- 1) Глюкозотолерантный тест
- 2) Гипоинсулинемическая проба

① Глюкозотолерантный тест - лабораторный метод исследования, который определяет уровень глюкозы в крови натощак и через 2 часа после нагрузки углеводами

Глюкозотолерантный тест проводится строго на то-ушке в утреннее время. Воду можно употребить но не более 0,5 л

Последний вечерний прием пищи должен содержать 30-50 г углеводов. За 3 дня до проведения теста нужно нормально питаться, не соблюдать диеты.

После забора крови натощак, необходимо выпить спец. р-р. Глюкоза (порция глюкозы 70 г и 250-300 мл воды) Пить р-р медленно, не более чем за 5 минут

Через 2 часа осуществляется повторный забор крови

В процессе теста нельзя курить.

Тест должен проводиться по венозной пункции

При выполнении теста берем минимум 2 пункции (24-28 недель) забор крови проводится через час после сахарной нагрузки, а потом через 2 часа.

2) Гипокалиемическая кома - острое патологическое состояние, при котором снижается кон-во калия в плазме.

### Причины:

- передозировка инсулина
- отсутствие пищи, недостаточное ее кон-во
- повышенная физ. нагрузка
- употребление алкоголя
- беременность

### Симптомы:

- потеря сознания
- повышение АД
- потливость
- судороги
- дрожь в теле

### Лечение:

- введение внутривенно 40% р-ра калия без инсулина
- необходимо покорректировать пациента