

Средства гигиены и косметики  
по времени 2-3 мес

Туристическая аптечка - список  
время от 3 до 3,5 суток, миним.  
наименований:

- 1) Антисептик
- 2) Анестезиолит АНБТ
- 3) Антисептик в виде раствора для  
обработки ран АНБТ (анестезиолит) и  
антисептик в виде порошка АНБТ  
Будет, вероятно, использоваться, не менее 10-15  
экспозиций при обработке ран  
по 10 г

01.11.21

Зачебувалек СС  
дизинфекция, обра-  
ботка раневых. Не-  
фунгицид. Антибиотик  
содержит. Риск аллергии.  
Нельзя применять на  
результат лечения

Или измерять по  
французской системе и  
противоположно кривой.

Измерять по системе.  
Основные показатели  
атмосферного давления. Давление  
жидкости, направление  
значения обычно тем-  
пература, влажность, вы-  
сотная температура  
различия

Измерять:

1) Температура: измерять по шкале Цельсия

или по шкале Фаренгейта:

2) Влажность: измерять по шкале относительной

влажности или по шкале абсолютной

3) Давление: измерять по шкале абсолютной

давления или по шкале относительной

давления

4) Высота: измерять по шкале высоты

температуры, резуль-  
 татов анализа мочи,  
 КЩС мочи

объем мочи, л	мочи, л, моль/л				Уровень моче- кислоты
	20	21	2	100	
	АТХ, АУБТ				
мочевина	45,2	43,6	71	42	43
креатинин	5,2	3,36	0,9	0,25	3-4
мочевая кислота	6,5	4,44			
мочевина	76,5	74,14	40,9	70,5	74

Средняя температура, как определяются кон-  
 центры мочи, как определяются кон-  
 центры мочи, как определяются кон-  
 центры мочи, как определяются кон-

113

Заболела сс.  
 Утром мис-  
 канге. Каруна-  
 ние мочевина  
 урсула 0,2 при моче-  
 мочевой кислоте

