

- Опухолевая
- Иммуноинвазивная
- Нарушения активного транспорта в клетках полинасосных желез кишечника

Механизм:
 Творение эндотелия

↑ Высокий уровень
 ↓ Амины
 Мембраны

Защитная реакция: продукция молекул клеточной адгезии

Моноциты и Т-лимфоциты прикрепляются к поверхности клеток эндотелия

Миграция через стенку артерии в субэндотелиальное пространство

Захват окисленного ЛПНД макрофагами

Образование липидов в клетке

Формирование пенистых клеток и бляшек и алгоритм оценки риска ИБС

Общий ХС ХС-ЛПВП

высокий уровень
ОХС $> 6,2$ ммоль/л

Экстремально
высокий уровень
ОХС $> 5,2 - 6,2$ ммоль/л

Тренированный
уровень ОХС $< 5,2$
ммоль/л

анализ
непроводить

ХС-ЛПВП $> 0,9$
ммоль/л

ХС-ЛПВП $\leq 0,9$
ммоль/л

ХС-ЛПВП $> 0,9$
ммоль/л

риск, отражение
модифицирующих
факторов.
Контрольное оп-
ределение через 1
год

проверить
подер. ОХС
в ХС-ЛПВП чрез
5 лет

ХС-ЛПВП $\leq 0,9$
ммоль/л

