

④ Вторично гипертензивный

СР

Кр. алкоголь

Тиротоксикоз

Обит. заб. печени

Коротический синдром

Применение β-блок-в и диуретиков
этакая диагностика

⑤ 1) Определить содержание общ. хол-на и триглицеридов

2) отн. липидного спектра

3) индекс атерогенности рач. по формуле: $UA = 0.2C - 2C \cdot (T/B/T) //$

$1/2C \cdot (T/B/T)$

Доп. инт. всег. заб. для которых характерно вт. ГИТ

⑥ ЧБС, атеросклероз, повышенная проницаемость стеноз сосудов

ЧБС - атеросклеротическое поражение стенок

коронарных артерий, ведущее к коронарному без-ию и

и-я в виде стенокардии, инфаркта, ишемического инсульта,

а также повышенной вязкости и вез. стеноза (в т.ч.)

Атеросклероз - при прогрессирующем заб-е артерий,

хар. пролиферативно-склеротическим ответом р-ва стенок

сосуд стенок и просв. ит пат. микроциркуляции

с формированием внешних степеней

① Метод, лежащий в основе анороскопии

- Промышленная
- Парашютистского в.в.
- Артериальная
- Циркит-комбинированная
- Промышленная
- Поверх. эндотелия
- Опухолевая
- Цирк-я
- Нарушение активного транспорта и деградации в клетках плазматической мембраны.
- изменение структуры и св-в мембраны клеток и мем. стр. биологических мембран
- пат. комбинация

② Алгоритм оценки риска ИБС

