

Тестирование по дисциплине «Инфекционные болезни» ОПОП ординатуры 31.08.49 Терапия

ФИО ординатора: *Диваган Кристина Артуровна*

1. МАССОВЫЕ ЗАРАЖЕНИЯ ВИРУСОМ ГЕПАТИТА А МОГУТ ПРОИСХОДИТЬ ЧЕРЕЗ
  - А) кровь
  - Б) воду**
  - В) воздух
  - Г) предметы быта
2. К ПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ ОТНОСЯТ
  - А) катаральные явления
  - Б) увеличение одного лимфатического узла
  - В) лихорадку больше месяца**
  - Г) неспецифический язвенный колит
3. ОПОРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДИАГНОЗА «ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ» ЯВЛЯЕТСЯ
  - А) исследование мочи на желчные пигменты
  - Б) определение уровня общего билирубина и его фракций
  - В) определение активности АЛТ
  - Г) обнаружение маркеров вирусных гепатитов**
4. ХРОНИЗАЦИЕЙ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА С ИСХОДОМ В ЦИРРОЗ ЧАЩЕ СОПРОВОЖДАЕТСЯ ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ
  - А) А
  - Б) С**
  - В) В
  - Г) Е
5. ОСТРЫЙ ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ А ВЕРИФИЦИРУЕТСЯ
  - А) обнаружением антител к вирусу гепатита А класса Ig M**
  - Б) повышением активности АЛТ
  - В) повышением уровня билирубина сыворотки крови
  - Г) обнаружением антител к вирусу гепатита А класса Ig G
6. К СПИД-АССОЦИИРОВАННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ ОТНОСЯТ
  - А) лептоспироз
  - Б) туберкулез**
  - В) хронический вирусный гепатит С
  - Г) менингококковую инфекцию
7. ХРОНИЧЕСКАЯ ДИАРЕЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЛЕЕ (НЕДЕЛЯ)
  - А) 4-6
  - Б) 6-8
  - В) 2-4**
  - Г) 8-10
8. САМЫМ РАННИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ
  - А) длительная диарея
  - Б) саркома Капоши
  - В) мононуклеозоподобный синдром**
  - Г) кахексия
9. ТИПИЧНЫМ СИНДРОМОМ ПРИ ШИГЕЛЛЕЗЕ ЯВЛЯЕТСЯ
  - А) колит**
  - Б) гастрит
  - В) энтерит
  - Г) гастроэнтерит
10. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ВАРИАНТОМ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОЙ ШИГЕЛЛЕЗНОЙ ДИЗЕНТЕРИИ ЯВЛЯЕТСЯ
  - А) гастритический
  - Б) колитический**
  - В) гастроэнтеритический
  - Г) гастроэнтероколитический
11. ДЛЯ ХОЛЕРЫ ХАРАКТЕРНО СОЧЕТАНИЕ СИМПТОМОВ:
  - А) обильный водянистый стул без запаха, отсутствие болей в животе, тошноты;**
  - Б. тошнота, рвота;
  - В. водянистый зловонный стул;
  - Г. жидкий зеленоватой окраски стул, диффузные боли в животе

12. СПЕЦИФИЧНЫМ ДЛЯ КОЛИТИЧЕСКОГО ВАРИАНТА ШИГЕЛЛЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕР СТУЛА

- А) обильный типа «мясных помоев»
- Б) обильный водянистый
- В) типа «малинового желе»

Г) скудный со слизью и прожилками крови

13. ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ ВЫЯВИТЬ ВОЗБУДИТЕЛЯ В МАТЕРИАЛЕ БОЛЬНОГО ОСТРЫМ ШИГЕЛЛЕЗОМ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) биологический
- Б) бактериологический
- В) вирусологический
- Г) серологический

14. ОСТРУЮ ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ В «ПЕРИОДЕ ОКНА» МОЖНО ПОДТВЕРДИТЬ ПО

- А) появлению белка p24 в крови
- Б) коэффициенту CD4/CD8
- В) лимфоцитозу в клиническом анализе крови
- Г) обнаружению атипичных мононуклеаров в крови

15. К ГЕОГЕЛЬМИНТОЗАМ ОТНОСИТСЯ

- А) энтеробиоз
- Б) тениоз
- В) аскаридоз
- Г) трихинеллез

25.04.2023

Результат: 100% (отлично)