


Предикторы ССЗ

О.В.Островский

Можно ли предсказывать будущее?



**Нам не дано предугадать,
Как наше слово отзовется...**

Ф.И. Тютчев

Предикторы

- **Предиктор** – «предсказатель»,
 - от английского *to predict* - предсказывать.

Соединение, повышение концентрации которого связано с повышением риска возникновения определенной патологии или группы взаимосвязанных патологий.

Уровень концентрации предиктора соответствует количественному показателю риска возникновения патологии и ее тяжести.

Относительный риск


Отношение частоты изучаемого исхода среди лиц, с повышенной концентрацией данного соединения (предиктора) к частоте данного исхода у лиц с нормальными уровнями данного соединения.


Относительный риск показывает силу связи между концентрацией предиктора и вероятностью возникновения и развития заболевания.

Задача современной КЛД

Переход от постановки диагноза,
«когда заболевание уже....»,
к оценкам рисков
возникновения потенциально
фатальных патологий,
пока они еще в субклинической
стадии

Как оценить риск атеросклероза?






Атеросклероз



Atherosclerosis – an inflammatory disease


ROSS *NEJM* 340: 115 - 126, 1999




Причины механических повреждений эндотелия:

- Артериальная гипертензия
- Турбулентный кровоток в местах разветвления артерий
- Взаимодействие эндотелия с пульсовой волной


Normal Artery



Injured Artery




Artery with Atherosclerosis



Механизм формирования атеросклеротической бляшки


Причины повреждения эндотелия в результате изменений в составе крови:

- Гиперлипидемия
- Окисленные ЛПНП
- Взаимодействие с иммунными комплексами
- Эндотоксины
- Симпатическая активность
- Окись углерода(курение)



NORMAL

Atherosclerosis




Lipids

Atherosclerotic plaque


FIXED CORONARY OBSTRUCTION
(Typical angina)

Platelet
aggregate




PLAQUE DISRUPTION

Healing



SEVERE FIXED CORONARY
OBSTRUCTION
(Chronic ischemic heart disease)


Platelet
aggregate



PLAQUE DISRUPTION



**MURAL THROMBUS WITH
VARIABLE OBSTRUCTION / ? EMBOLI**
(Unstable angina or acute subendocardial
myocardial infarction or sudden death)



**OCCLUSIVE
THROMBUS**
(Acute transmural myocardial
infarction or sudden death)

Вероятность заболевания коронарной болезнью сердца в большой степени определяется наличием определенных факторов риска.

Факторы риска - это важнейшие факторы внутренней и внешней среды, которые статистически значимо связаны с появлением ИБС.


К важнейшим факторам риска заболевания атеросклерозом и ИБС относятся:

- артериальная гипертензия
- гиперлипидемия
- возраст
- семейная предрасположенность
- курение
- диабет
- гиподинамия
- ожирение
- мужской пол

Прогрессирование сердечно-сосудистых болезней




Транспорт липидов.




Липиды поступают в организм с пищей, гидролизуются в кишечнике и метаболизируют, в основном, в печени. Из многих форм липидов, циркулирующих в крови, особое значение имеют:

- ТРИГЛИЦЕРИДЫ (ТГ), ФОСФОЛИПИДЫ (ФЛ) и ХОЛЕСТЕРИН (ХЛ)
- ТРИГЛИЦЕРИДЫ - важный источник энергии для клеточного метаболизма.
- ФОСФОЛИПИДЫ - являются эмульгаторами жиров и входят в качестве основного компонента в состав всех клеточных мембран.
- ХОЛЕСТЕРИН - входит в состав всех клеточных мембран, необходим для их стабилизации; является предшественником стероидных гормонов и желчных кислот.




По размерам и относительному содержанию холестерина, триглицеридов и фосфолипидов липопротеидные частицы делятся на 4 главных класса, роль которых в развитии атеросклеротического поражения сосудов различна.

- хиломикроны (ХМ)
- липопротеиды очень низкой плотности (ЛПОНП)
- липопротеиды низкой плотности (ЛПНП)
- липопротеиды высокой плотности (ЛПВП)



- Unesterified cholesterol
- Phospholipid
- Cholesteryl ester
- Apoprotein B-100

Structure of HDL Particle



A-I, A-II = apolipoprotein A-I, A-II;
CE = cholesteryl ester; TG = triglycerides

Липопротейны

	Хиломикроны	ЛОНП	ЛПП	ЛНП	ЛВП
Плотность, г/мл	0,92-0,98	0,96-1,00		1,00-1,06	1,06-1,21
Диаметр частиц, нм	Более 120	30-100		21-30	7-15
Состав, %:					
белки	2	10	11	22	50
ФЛ	3	18	23	21	27
ХС	2	7	8	8	4
эхе	3	10	30	42	16
ТАГ	85	55	26	7	3
Основные аполипопротеины	В-48 С-II Е	В- 100 С-II Е	В- 100 Е	В-100	А С-II Е

Апопротеины

Аполипопротеин	Функция
A-I	Кофактор лецитин-холестерин-ацилтрансферазы Структурная (в ЛПВП)
A-II	Активатор липазы печени Структурная (в ЛПВП)
B-100	Структурная (в лпнп и лпонп) связывание с рецепторами
B-48	Структурная (в хиломикронах)
C-I	Кофактор лецитин-холестерин-ацилтрансферазы(?)
C-II	Активатор липопротеинлипазы
C-III	Ингибитор клиренса хиломикро-нов и остаточных частиц
E	Связывание с рецепторами


Липопротейны

	Хиломикроны	ЛОНП	ЛПП	ЛНП	ЛВП
Функция	Транспорт липидов из клеток кишечника	Транспорт липидов, синтезируемых в печени	Промежуточная форма превращения ЛОНП в ЛНП	Транспорт холестерина в ткани	Транспорт холестерина из тканей в печень Удаление избытка холестерина из клеток. Донор апопротеинов
Место образования	Эпителий тонкой кишки	Клетки печени	Кровь	Плазма крови(из ЛОНП)	В клетках печени - ЛВП-предшественники

Основные ферменты, расщепляющие и модифицирующие липиды липопротеидов:


- внепеченочная липаза (липопротеинлипаза - ЛПЛ) - содержится на поверхности эндотелия капилляров и скелетных мышц. Регулируется инсулином. Расщепляет триглицериды.
- печеночная липаза(ПЛ)- находится на поверхности эндотелиальных клеток печени. Расщепляет триглицериды.
- лецитин-холестерин-ацилтрансфераза - синтезируется в печени, но функционирует в плазме. Катализирует реакцию образования эфиров холестерина.

- Липопротеиды осуществляют транспорт холестерина в клетки, связываясь со специфическими рецепторами, которые способны узнавать ЛПНП, ЛПВП и ремнанты(остатки) хиломикрон по апобелкам А,В,Е.



VLDL is produced in the liver from hepatic triglycerides and cholesterol.

Lipoprotein lipase (LPL) binds to apolipoprotein (apo) C-II and cleaves the triglycerides in the VLDL core, depleting it of triglycerides and leaving intermediate-density lipoproteins (IDL).






Рис. 6.5. Функции липопротеинов в транспорте липидов.




Х-ЛПНП и ХЛПВП – предикторы ССЗ

Когда много «плохого» и мало «хорошего»

Высокие
уровни
Х-ЛПНП
и низкие
уровни
Х-ЛПВП
предикторы
возникновения
и развития
атеросклероза

High LDL-C and Low HDL-C: Increased Risk of CHD



Castelli WP et al. Can J Cardiol. 1988;4(suppl A): 5A-10A.

- Риск ИБС почти вдвое выше у лиц с уровнем холестерина 250 мг/дл (6.5 ммоль/л), по сравнению с теми, у кого уровень холестерина 200 мг/дл (5.2 ммоль/л) и менее.
- Вместе с тем, только у 25% всех умерших от инфаркта миокарда уровень холестерина был более 300мг/дл.
- Установлено, что снижение холестерина сыворотки на 1% может приводить к снижению риска возникновения ИБС на 2%.

- С помощью гипохолестеринемической диеты можно снизить уровень холестерина крови на 10-15%.
- Гиполипидемические препараты приводят к дополнительному снижению содержания общего холестерина на 10-27%, холестерина ЛПНП на 8-32%, триглицеридов на 11-25%, повышению содержания холестерина ЛПВП на 3-9%.
- Эти эффекты можно достоверно обнаружить только при условии, что используемые методы определения липидов в данной лаборатории дают результаты, отклоняющиеся от истинных значений не более, чем на 3-5%.

Так как лабораторное исследование липидов крови имеет важное значение для диагноза дислипидемий и оценки эффективности гиполипидемической терапии, врачу необходимо хорошо ориентироваться в следующих главных проблемах биохимического тестирования:

- биологическая вариабельность индивидуальных результатов
- правила подготовки пациентов для биохимического исследования липидов
- выбор оптимального набора биохимических тестов

Индивидуальный коэффициент вариации:

- для общего холестерина - около 7%
- для ЛПНП холестерина - около 12%
- для ЛПВП холестерина - около 15%
- для триглицеридов - до 25% */

*/ содержание триглицеридов в плазме подвержено существенным колебаниям в зависимости от состава пищи и приема алкоголя.

Классификация гиперхолестеринемий, отражающая связь уровня холестерина (ХС) и риск ИБС

- желаемый уровень ХС в крови — $< 5,2$ ммоль/л (< 200 мг/дл),
- погранично высокий — $5,2-6,2$ ммоль/л ($200-239$ мг/дл)
- высокий — $> 6,2$ ммоль/л или $> 6,5$ ммоль/л) для мужчин и женщин старше 20 лет.

На основании названных критериев предложено выделять

- умеренную гиперхолестеринемию (ГХС, $6,2-7,5$ или $6,5-7,8$ ммоль/л)
- тяжелую ГХС ($> 7,5$ или $> 7,8$ ммоль/л).

Соответственно изменены критерии и для ХС липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), тогда как уровень «нормы» для триглицеридов ($< 2,3$ ммоль/л) и ХС липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) оставлен прежним ($0,92- 1,95$ ммоль/л)

В 2001 году опубликован
новый, третий доклад
экспертов NCEP,
посвященный выявлению,
оценке и терапии высокого
уровня холестерина у
взрослых (Adult Treatment
Panel III, АТР III)

АТР III. Классификация уровней ХС и ТГ сыворотки крови, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП, (мг/дл)

ХС ЛПНП	
<100 (2,6)	Оптимальный
100-129 (2,6-3,3)	Выше оптимального
130-159 (3,4-4,1)	Погранично высокий
160-189 (4,1-4,9)	Высокий
>190 (4,9)	Очень высокий
Общий холестерин	
<200 (5,2)	Желательный
200-239 (5,2-6,2)	Погранично высокий
>240 (6,2)	Высокий

АТР III. Классификация уровней ХС и ТГ сыворотки крови, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП, (мг/дл)

ХС ЛПВП	
<40 (1,04)	НИЗКИЙ
>60 (1,55)	ВЫСОКИЙ
ТГ	
<150 (1,68)	нормальный
150-199 (1,68-2,23)	Погранично высокий
200-499 (2,24-5,60)	Высокий
>500 (5,60)	Очень высокий

Скрининг

- **Сокращенное исследование липидного профиля** включает определение общего холестерина и холестерина ЛПВП; оно служит для раннего выявления гиперлиппротеидемии и проводится каждые 5 лет всем лицам старше 20 лет, особенно тем, чьи родственники страдают гиперлиппротеидемией или ИБС. Исследование можно проводить не натощак. Одновременно определяют наличие факторов риска ИБС

- **Полное исследование липидного профиля** проводят всем больным ИБС, а также в случае, если при сокращенном исследовании выявлено повышение уровня общего холестерина или снижение уровня холестерина ЛПВП.

Полное исследование липидного профиля

- проводят натощак.
- Определяют общий холестерин, холестерин ЛПВП и триглицериды;
- холестерин ЛПНП вычисляют по формуле:
- $\text{Холестерин ЛПНП} = \text{общий холестерин} - \frac{\text{холестерин ЛПВП} - \text{триглицериды}}{5}$.
- Формулу можно использовать при уровне триглицеридов не выше 400 мг%, в противном случае необходимо прямое определение.
- Исследование проводят 2—3 раза с интервалом 1—8 нед на фоне привычного для больного питания.

- Липидный профиль меняется при:
 - похудании,
 - беременности,
 - тяжелых заболеваниях
 - больших операциях
- в подобных случаях исследование откладывают по крайней мере на 6 нед.
- При инфаркте миокарда определение можно провести в первые 24 ч, когда уровень липопротеидов не успевает сильно измениться (в дальнейшем уровень общего холестерина и холестерина ЛПВП снижается).

Обследование в отсутствие ИБС

А. Сокращенное исследование липидного профиля

1. Холестерин ЛПВП ниже 40 мг% (1 ммоль/л)— один из главных факторов риска ИБС. Показано полное исследование липидного профиля.

2. Холестерин ЛПВП выше 40 мг%

- a. **Общий холестерин желательный ниже 200 мг% (5,2).** Дают рекомендации по предупреждению атеросклероза (диета, физическая активность, устранение факторов риска); исследование повторяют через 5 лет.
- b. **Общий холестерин погранично высокий 200—239 мг% (5,2-6,2).** Если факторов риска ИБС менее двух, дают рекомендации по предупреждению атеросклероза. При двух и более факторах риска проводят полное исследование липидного профиля. Исследование повторяют через 1 год.
- c. **Общий холестерин высокий 240 мг% (6,2) и более.** Проводят полное исследование липидного профиля.

В. Полное исследование липидного профиля

1. **Холестерин ЛПНП оптимальный и выше оптимального ниже 130 мг% (3,3).** Дают рекомендации по предупреждению атеросклероза. Через 5 лет проводят сокращенное исследование.
2. **Холестерин ЛПНП погранично высокий 130—159 мг% (3,4-4,1).** Если факторов риска ИБС менее двух, дают рекомендации по предупреждению атеросклероза. Настоятельно рекомендуют придерживаться диеты. В дальнейшем сокращенное исследование липидного профиля и подсчет факторов риска ИБС проводят ежегодно. При двух и более факторах риска тактика как в п.3.
3. **Холестерин ЛПНП высокий 160 мг% (4,1) и более.** Проводят клиническое (анамнез, физикальное исследование) и лабораторное обследование для выявления причины гиперлипотеидемии. Назначают диету или медикаментозное лечение

Обследование при ИБС

- По результатам двукратного (с интервалом 1—8 нед) полного исследования липидного профиля рассчитывают средний уровень холестерина ЛПНП (если результаты различаются более чем на 30 мг%, исследование повторяют еще раз).


- **Холестерин ЛПНП оптимальный менее 100 мг% (2,6).** Дают рекомендации по диете и физической нагрузке. В дальнейшем исследование повторяют ежегодно.
- **Холестерин ЛПНП выше оптимального 100 мг% (2,6) и выше.** Проводят обследование для выявления причины гиперлиппротеидемии, дают рекомендации по физической нагрузке. Назначают диету, а при погранично высоком уровне холестерина ЛПНП выше 130 мг% (3,3) — медикаментозное лечение

Триглицериды

- **А. Менее 200 мг% (2,23).** Нормальный и погранично высокий уровень, лечения не требуется.
- **Б. Высокий 200—500 мг% (2,24-5,60).** Назначают диету I степени. ЛФК, рекомендуют похудание, ограничение потребления алкоголя. Показания к медикаментозному лечению: неэффективность перечисленных мер, ИБС у больного или его родственников, другие факторы риска ИБС.
- **В. Очень высокий 500—1000 мг% (>5,6).** Назначают диету, ЛФК, рекомендуют похудание. Если уровень триглицеридов остается выше 500 мг%, начинают медикаментозное лечение.
- **Г. Более 1000 мг% (10,1).** Высок риск панкреатита и других осложнений гипертриглицеридемии. Проводят активное медикаментозное и немедикаментозное лечение, выясняют причину гипертриглицеридемии.

«Плохой» Х-ЛПНП может быть «еще хуже»

- Чем меньше размер частиц Х-ЛПНП, тем выше их атерогенность
- Крупные частицы Х-ЛПНП - тип А - LDL I
- Мелкие плотные Х-ЛПНП - тип В - LDL III Имеют более высокую плотность
- Размер Х-ЛПНП - предиктор острых коронарных событий и развития ССЗ



Почему малые плотные X-ЛПНП «еще хуже»?


Повышена способность:

- к окислению
- к проникновению через стенки сосудов

Изменена конформация АпоВ -
из-за этого уменьшено сродство
к рецептору X-ЛПНП
(хуже поглощается печенью)

Повышенные уровни:
малых плотных X-ЛПНП
связаны:

- с высокими триглицеридами в плазме
 - с низкими X-ЛПВП
- инсулинрезистентностью




A blue-tinted image of a pyramid floating on a body of water. The pyramid is transparent, showing its internal structure, and its reflection is clearly visible on the water's surface. The background is a solid blue gradient.

**АpoB и АpoA-1 предсказывают ССЗ
даже при нормальных холестеринах**

Апо В отражает уровень мп Х-ЛПНП когда суммарная концентрация Х- ЛПНП в норме

Х- ЛПНП

3,6
ммоль/л




апо В

Крупные Х-ЛПНП

0,8 г/л

+

3,6
ммоль/л



апо В

Мелкие Х- ЛПНП

1,5 г/л

++

Апо В

Риск ССЗ

Предикторные характеристики АpoB/ApoB-1

Проспективные исследования

AMORIS (175 000 человек, Швеция)

**INTERHEART (30 000 человек, 52 страны
мира)**

Показана строгая прямая корреляция между высокими соотношениями АpoB/ApoB-1 и повышенными рисками фатального и острого инфарктов миокарда независимо от возраста, пола и расы


Риск фатальных инфарктов миокарда



Риск фатальных инфарктов миокарда



АпоВ / АпоА и риск фатальных инфарктов миокарда



Аполипопротеин В/Аполипопротеин А

Результаты проекта AMORIS

Высокие уровни АпоВ строго коррелируют с повышенным риском ССЗ

Низкие уровни АпоА-1 – кардиопротективный фактор, независимый от пола.


АпоВ - более сильный индикатор риска ССЗ, чем Х- ЛПНП , особенно когда Х- ЛПНП в норме или понижен

**Соотношение АпоВ/ АпоА-1 указывает на риск ССЗ
Независимо от уровня липидов и даже в том случае, когда уровень липидов в норме.**

Соотношение апоВ/апоА-1 имеет более строгую связь с риском ССЗ, чем ОХ/Х-ЛПНП или Х-ЛПНП/Х-ЛПВП.

Оценка риска ССЗ может быть выражена одним числом.

Риск инфаркта миокарда в зависимости от соотношения ApoB/ApoA-I



ApoB/ApoA-I

Мужчины 0.4
Женщины 0.3

0.7
0.6

0.9
0.8

1.1
1.0

AMORIS; Walldius G et al. Lancet 2001;358:2026 and INTERHEART: Yusuf S et al. Lancet 2004;364:937.

«Манифест» 30 ученых из 10 стран

Journal of Internal Medicine 2006; 259: 247–258

doi:10.1111/j.1365-2796.2006.01616.x

REVIEW

Apo B versus cholesterol in estimating cardiovascular risk and in guiding therapy: report of the thirty-person/ten-country panel

P. J. BARTER¹, C. M. BALLANTYNE², R. CARMENA³, M. CASTRO CABEZAS⁴, M. JOHN CHAPMAN⁵, P. COUTURE⁶, J. DE GRAAF⁷, P. N. DURRINGTON⁸, O. FAERGEMAN⁹, J. FROHLICH¹⁰, C. D. FURBERG¹¹, C. GAGNE¹², S. M. HAFFNER¹³, S. E. HUMPHRIES¹⁴, I. JUNGNER^{15,16}, R. M. KRAUSS¹⁷, P. KWITEROVICH¹⁸, S. MARCOVINA¹⁹, C. J. PACKARD²⁰, T. A. PEARSON²¹, K. SRINATH REDDY²², R. ROSENSON²³, N. SARRAFZADEGAN²⁴, A. D. SNIDERMAN²⁵, A. F. STALENHOF⁷, E. STEIN²⁶, P. J. TALMUD¹⁴, A. M. TONKIN²⁷, G. WALLDIUS²⁸ & K. M. S. WILLIAMS¹³

From the ¹Heart Research Institute, Camperdown, Sydney, NSW, Australia; ²Baylor College of Medicine, Houston, TX, USA; ³Department of Endocrinology and Nutrition, Facultad de Medicina y Hospital Clínico Universitario, Valencia, Spain; ⁴St Franciscus Gasthuis, Rotterdam, the Netherlands; ⁵Hôpital de la Pitié, Paris, France; ⁶Centre Hospitalier Universitaire de Québec, Ste-Foy, Québec, Canada; ⁷Radboud University Nijmegen Medical Center, Nijmegen, the Netherlands; ⁸Division of Cardiovascular and Endocrine Science, Department of Medicine, Manchester Royal Infirmary, University of Manchester, Manchester, UK; ⁹Aarhus Amtssygehus University Hospital, Aarhus C, Denmark; ¹⁰University of British Columbia, St Paul's Hospital, Vancouver, BC, Canada; ¹¹Wake Forest University School of Medicine, Winston-Salem, NC, USA; ¹²Université de Laval, Laval, Québec, Canada; ¹³University of Texas Health Science Center, San Antonio, TX, USA; ¹⁴Royal Free and University College Medical School, London, UK; ¹⁵Clinical Epidemiology Unit, Department of Medicine, Karolinska Institute, Stockholm; ¹⁶CALAB Research, Stockholm, Sweden; ¹⁷Children's Hospital Oakland Research Institute, Oakland, CA; ¹⁸The Johns Hopkins Medication Institutions, Baltimore, MD; ¹⁹University of Washington, Seattle, WA, USA; ²⁰Glasgow Royal Infirmary, Glasgow, UK; ²¹University of Rochester, Rochester, NY, USA; ²²All India Institutes of Medical Sciences, New Delhi, India; ²³Northwestern University, Chicago, IL, USA; ²⁴Isfahan Cardiovascular Research Center, Isfahan, Iran; ²⁵Mike Rosenbloom Laboratory for Cardiovascular Research, McGill University Health Sciences Centre, Montreal, Quebec, Canada; ²⁶Metabolic and Atherosclerosis Research Center, Cincinnati, OH, USA; ²⁷Monash University, Victoria, Australia; and ²⁸King Gustaf V Research Institute and Karolinska Institute, Stockholm, Sweden

«Манифест» 30 ученых из 10 стран

Призыв к новым международным правилам оценки сердечно-сосудистых рисков

1. Риск атеросклероза связан не столько с концентрацией холестерина, сколько с количеством циркулирующих атерогенных частиц, которые связываются со стенками сосудов и проникают в артериальные стенки
2. АпоВ - самый точный индикатор риска ССЗ
3. Апо В - самый адекватный показатель эффективности терапии, направленной на снижение липидов
4. Необходимо заменить определение общего холестерина и Х-ЛПНП на измерение концентрации АпоВ.
5. Соотношения АпоВ/АпоА – по своей точности в оценке коронарных рисков у пациентов с бессимптомными ССЗ и у лиц, страдающих диабетом, превосходят индикаторные свойства всех других соотношений холестерина
6. Следует снизить целевые показатели концентрации АпоВ с <90 мг/дл до <80 мг/дл.

О чем говорят нормальные значения холестерина, Х-ЛПНП и Х-ЛПВП?

Определение общего холестерина и прямое определение Х-ЛПНП и Х-ЛПВП не утратило своей диагностической ценности.

Однако, согласно общепризнанным исследованиям

Патологические уровни общего холестерина, Х-ЛПНП и Х-ЛПВП действительно свидетельствуют об атеросклерозе,


Нормальные уровни общего холестерина, Х-ЛПНП и Х-ЛПВП

не обязательно свидетельствуют о том, что атеросклероза нет



**Липопротейн Lp(a) –
индикатор генетической предрасположенности
к сердечно-сосудистым заболеваниям**

Этот загадочный Lp(a)



**Lp (a) – опасный
родственник «плохого»
Х-ЛПНП**

**Состоит из Х-ЛПНП
с «довеском» -
аполипопротеином (a)**

**Апо (a) связан с Апо В
дисульфидной связью**

Этот загадочный Аро (а)

С другой стороны
аполипопротеин (а) –
близкий родственник
«хорошего»
плазминогена, Белка
предшественника
плазмина, который
расщепляет фибрин
и, тем самым,
разрушает тромбы



Этот загадочный Аро (а)

Аро (а) –
гликопротеин,
его белковая часть
состоит из доменов
«kringle», имеющих
гомологию с
плазминогеном.






Схема строения Lp (a)



Schematic Model of Lp(a)




Апо (а) содержит домены, гомологичные «kringle» IV и V плазминогена




У людей разная длина Apo (a)

Количество доменов «kringle» в молекуле Апо (a) у разных людей разное: от 12 до 51 это опосредованно генетически — длиной гена апо (a)




Ген Аро (a) - cDNA


- Гипервариабельная зона [2] x N может кодировать от 1 до ~ 40 доменов kringle 4 тип 2, что приводит к образованию изоформ аро(a).
- Домены kringle 4 типы (1 и 3 до 10) и kringle 5 (V) присутствуют по одной копии.
- Некоторые домены kringle 4 обеспечивают аро(a) способностью связывать лизин-фибрин, сходной с таковой у плазминогена.



Лipoppoтeины пepeнocят xолecтepин.
Ho чтo дeлaeт Lp(a)?



Метаболизм холестерина



Lp (a): чем меньше размер – тем выше уровень

**Известны 34 изоформы Lp (a) –
От ~280 to 800 kDa,
30% массы – углеводы
(сиаловая кислота).**

Lp(a) секретируется в плазму из печени.

**Чем меньше размер апо(a) –
Тем выше уровень Lp(a) в плазме**

**Механизма катаболизма
не известен.
Функция не известна.**


Чем меньше размер (апо) а – тем атерогеннее

Уровни Lp(a) у разных
индивидов:


от <1 до >1000 мг/л.

Размеры молекул Apo(a)
и концентрация Lp(a)
предопределяются
генетически

Повышенный уровень Lp(a) –
наиболее частое генетическое
нарушение метаболизма
липидов у лиц с ранними ССЗ.



Патогенетические свойства Lp(a)



Домены Kringle 4 стимулируют:

- атерогенез,
- воспаление,

Ингибирует:


- ангиогенез,
- фибринолиз

Х-ЛПНП часть Lp (a) вызывает образование пенистых клеток, путем взаимодействия Kringle 4 со специфическими рецепторами на пенистых клетках

IL – интерлейкин

SMC – гладкомышечные клетки

Патогенетические свойства Lp(a)




**Ингибирование
плазминогена
из-за его связывания
с Lp(a).**

**Ингибирование
образования
плазмина ведет к
накоплению**

- фибрина,
- холестерина и
- гладкомышечных
клеток
на стенках
сосудов

Lp(a) индуцирует воспаление в стенках сосудов

A: Interaction between Lp(a) and Mac-1 on monocytes.




B: Consequences of the Mac-1/Lp(a) interaction:

- ➔ **Proinflammatory action of Lp(a)**
Increased recruitment of monocytes to atherosclerotic vessels.
- ➔ **Prothrombotic action of LP(a)**
Increased tissue factor expression on monocytes.

Lp(a) – адгезивный субстрат для моноцитов. Lp(a) активирует воспалительные клетки за счет взаимодействия с интегрином Mac-1. Интегрины - трансмембранные гликопротеины, функционирующие как клеточносубстратные, так и межклеточные адгезивные рецепторы; которые связывают клетки с их средой.

Проатерогенные и протромботические свойства Lp(a)



Lp(a) – фактор риска четырёх форм сосудистых патологий

Заболеваний коронарных артерий

Заболеваний периферических сосудов

Ишемических инсультов

Аневризмы абдоминальной аорты


Jones GT, van Rij AM, Cole J et al.

**Plasma Lipoprotein(a) Indicates Risk for
4 Distinct Forms of Vascular Disease.**

Clin Chem. 2007 Mar 22;

Lp(a), независимый от Х-ЛПНП, фактор риска

- Сердечно-сосудистых заболеваний
- Цереброваскулярных заболеваний
- Атеросклероза
- Тромбоза
- Ишемических инсультов



Lp(a)



Lp (a) - предиктор

**Генетической предрасположенности
к сердечно-сосудистым
заболеваниям**

**Генетически опосредованных острых
коронарных событий**

**Генетически опосредованных
ишемических инсультов**

Danesh J, Collins R, Peto R. Lipoprotein(a) and coronary artery disease. Meta-analysis of prospective studies. *Circulation* 2000;102: 1082–5.




Когда следует измерять Lp(a)?

У пациентов с ранними ССЗ,
При частых случаях ССЗ в семейной истории
При диагностированных ССЗ при отсутствии
традиционных факторов риска
Если липидоснижающая терапия (статины)
не снижает гиперхолестеринемию
При назначении ангиопластики,
При назначении аортокоронарного шунтирования

Понизить уровень Lp(a)
практически невозможно

ни изменением диеты,
ни снижением веса,
ни обычно применяемыми препаратами
(статины).

Koschinsky ML. Lipoprotein(a) and atherosclerosis:
new perspectives on the mechanism of action
of an enigmatic lipoprotein.
Curr Atheroscler Rep. 2005;7(5):389-395.





Что мы определяем, когда измеряем X-ЛПНП и Апо В?

При прямом определении X-ЛПНП и
иммунотурбидиметрическом измерении Апо В
в результаты входят и концентрации Lp(a)

При высоких уровнях X-ЛПНП и Апо В
целесообразно определять, какой вклад в них
вносит генетически опосредованное
повышение концентрации высокоатерогенного
и протромботического Lp(a)

Это принципиально для правильной терапии.



C-Reactive Protein and Other Emerging Blood Biomarkers to Optimize
Risk Stratification of Vulnerable Patients. Tsimikas S, Willerson JT, Ridker PM.
Journal of the American College of Cardiology, 2006, Vol. 47, No. 8 Suppl C47:C19 –31

Референсные значения уровней $Lp(a)$

Целевой уровень < 14 мг/дл

Пограничный риск: 14 - 30 мг/дл

Высокий риск: 31 - 50 мг/дл



Очень высокий риск: > 50 мг/дл

Апопротеины - независимые предикторы стабильных заболеваний коронарных артерий


Соотношение
apoB/apoAI

apoB

Lp(a)



Rasouli M, Kiasari AM, Mokhberi V.
The ratio of apoB/apoAI, apoB and
lipoprotein(a) are the best predictors
of stable coronary artery disease.
Clin Chem Lab Med. 2006;
44(8):1015-1021





С-реактивный белок - предиктор ССЗ


Как действует СРБ

**СРБ связывает широкий спектр лигандов –
компонентов микроорганизмов,
токсинов,
частиц поврежденных тканей.**


**Продукты такого взаимодействия
активируют комплемент
по классическому пути,
стимулируя процессы фагоцитоза
и удаления вредных соединений.**

**СРБ взаимодействует
с Т-лимфоцитами,
фагоцитами и тромбоцитами,
регулируя их функции
в условиях воспаления.**

С-реактивный белок распознает только
фосфолипиды бактериальной клеточной стенки



Манноза-связывающий белок распознает только
маннозные мостики бактерий




Базовые уровни СРБ

Раньше: при концентрации СРБ ниже 5 мг/л


- констатировали отсутствие воспаления,
- точное определение уровня СРБ считали клинически НЕ значимым.

Метод
высококчувствительной
иммунотурбидиметрии
с латексным усилением
hs – high sensitive
Нижний предел
определения
0,05 мг/л.



Повышенные базовые уровни СРБ


**Базовые уровни
СРБ возрастают при
слабом
Воспалительном
ответе и вызывают
атерогенез за счет
прямой активации
эндотелиальных
клеток.**



О чем свидетельствует hsCRP

Большую роль в атерогенезе, включая инициацию, развитие повреждения сосудистой стенки, нестабильность атеромы и возникновение тромбов, играет воспаление, в развитии которого участвует СРБ.

Атеросклероз — длительное, вялотекущее хроническое воспаление в интиме сосуда





О чем свидетельствует hsCRP

Риск сосудистых осложнений

- острый инфаркт миокарда,
- инсульт

Базовые концентрации CRP (мг/л)

- меньше 1,0 – минимальный,
- при 1,1 – 1,9 – низкий,
- при 2,0 – 2,9 – умеренный
- выше 3 мг/л - высокий.



СРБ в атерогенезе – казуативный агент !

Статины, снижающие Х-ЛПНП, уменьшают и концентрацию СРБ. Снижение Х-ЛПНП на 50%, и СРБ ниже 2 мг/л - уменьшает вероятность сердечного приступа на 50%. У больных, у которых после приема статинов уровень СРБ был ниже, было лучшим клиническое состояние *независимо от уровня Х-ЛПНП*

Повышение базового уровня СРБ связано с повышенным риском коронарных приступов даже в отсутствие гиперлипидемии


Ridker PM et al. Relative efficacy of atorvastatin 80 mg and pravastatin 40 mg in achieving the dual goals of low-density lipoprotein cholesterol <70 mg/dl and C-reactive protein <2 mg/l: an analysis of the PROVE-IT TIMI-22 trial
J Am Coll Cardiol. 2005; 45 (10):1644-1648.

hsCRP – маркер кардиоваскулярного риска

**Повышенный
hsCRP
указывает
на развитие
атеросклероза
даже тогда,
когда Х-ЛПНП
не повышен**

Verma S et al
**C-reactive protein
comes of age**

*Nature Clinical Practice
Cardiovascular Medicine* (2005) **2**,
29-36





**С-реактивный белок - предиктор
осложнений сердечно-сосудистой системы**

СРБ – предиктор макрососудистых осложнений при метаболическом синдроме

При метаболическом синдроме (МС) – индуцируется воспаление в сосудах.

У взрослых пациентов с МС риск иметь СРБ выше 3,0 мг/л – в 4 раза выше, чем у здоровых.

При МС – повышенный СРБ связан с повышенными рисками сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Ford E.S. et al. The metabolic syndrome and concentrations of C-reactive protein among U.S. youth. Diabetes Care. 2005; 28(4): 878-881

У здоровых детей СРБ – 0,5 мг/л

У детей с ожирением – 2,3 мг/л,

Desideri G et al. Early Activation of Vascular Endothelial Cells and Platelets in Obese Children J Clin Endocrinol Metab, June 2005, 90(6):3145–3152



СРБ и диабет 1-го типа

У пациентов с СД 1, но без осложнений, СРБ повышен в 3 раза

У пациентов с осложнениями СРБ повышен в 5 раз

hsСРБ – предиктор осложнений при диабете 1-го типа

Coulon J, et al. Increase in C-reactive protein plasma levels during diabetes in infants and young adults. Presse Med. 2005; 34 (2 Pt 1): 89-93



СРБ и диабет 2-го типа

**При диабете 2-го типа
Сердечно-сосудистые риски
повышены в 2 – 4 раза.**

**Патогенез СД 2
сильно связан
с индукцией острой фазы
и повышением СРБ**

**Garanty-Bogacka B, et al., Relation of acute-phase
reaction
and endothelial activation to insulin resistance and
adiposity
in obese children and adolescents.
Neuro Endocrinol Lett. 2005 26(5):473-479**



СРБ - предиктор рисков в нефрологии

У многих пациентов с трансплантированной почкой летальность связана не с отторжением трансплантата, а с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Воспаление у таких пациентов непосредственно связано с атеросклерозом и именно оно может вызывать как отторжение пересаженной почки, так и сердечно-сосудистые заболевания.

Претрансплантационный уровень СРБ – это предиктор острого отторжения и хронической трансплантационной нефропатии

Cueto-Manzano AM et al. Markers of inflammation before and after renal transplantation. Transplantation. 2005; 80(1): 47-51



СРБ – предиктор рисков при гемодиализе

При гемодиализе у 35-65% пациентов наблюдается хроническое воспаление, которое характеризуется повышением СРБ и провоспалительных цитокинов.

Причина такого воспаления не ясна; возможно:

- образование комплемента при контакте белков плазмы с мембраной,
- обратная фильтрация контаминированного диализата в кровоток,
- непосредственный контакт клеток крови с диализной мембраной.

Повышение СРБ во время гемодиализа

- на 1 мг/л - повышает риск летальности на 9%.
- на 3 мг/л - повышает риск летальности на 30%

Если после диализа СРБ не снижается – это плохой прогноз!

Korevaar JC et al. Effect of an increase in C-reactive protein level during a hemodialysis session on mortality. Am Soc Nephrol. 2004; 15 (11): 2916 - 2922



СРБ в оценке рисков при беременности

Беременные женщины с высоким СРБ в течение 5-19 недели беременности имеют высокий риск преждевременных родов.

При доношенной беременности уровень СРБ - 2,4 мг/л

В случае преждевременных родов - 3,2 мг/л

При СРБ - 8 мг/л и выше риск преждевременных родов возрастает в 2,5 раза, независимо от других факторов риска.

**Pitiphat W, et al Plasma C-reactive protein in early pregnancy and preterm delivery
Am J Epidemiol. 2005;162(11):1108-13**






Гомоцистеин – предиктор ИБС и ее осложнений

Что такое гомоцистеин?

Серосодержащая аминокислота,
промежуточный продукт
метаболизма метионина и цистеина



Homocysteine

Причины гипергомоцистеинемии

Дефицит витаминов

B₆

B₁₂

фолиевой кислоты

(кофакторы ферментов метаболизма ГЦ)

Некоторые патологии

(хроническая почечная недостаточность,

гипофункция щитовидной железы,


B 12 - дефицитная анемия,

онкологические заболевания)

Генетические дефекты,

повреждающие ферменты метаболизма гомоцистеина.

Последствия гипергомоцистеинемии



Почему необходимо измерять ГОМОЦИСТЕИН




Диагностические значения ВЫСОКОГО ГОМОЦИСТЕИНА

- Предиктор ИБС и ее осложнений
- Независимый фактор риска
- развития атеросклероза,
- ИМ,
- Инсульта.
- Высокий гомоцистеин увеличивает риск развития тромбоза глубоких вен
- Индикатор риска общей смертности
- Вызывает осложнения при беременности и родах (невынашивание беременности, хроническая фетоплацентарная недостаточность, внутриутробная гипоксия плода)
- Фактор риска развития сенильного остеопороза



Показания к измерению уровня гомоцистеина

- ИБС
- Гипертония
- Почечная недостаточность
- Тромбозы различного вида
- Диабет
- Гиперлипидемия
- Осложнения беременности
- Болезнь Альцгеймера
- Недостаточность витаминов
- Курение






Гликозилированный гемоглобин HbA1c - предиктор макро- и микрососудистых осложнений диабета

НbA1с – «память» о сахаре в крови, которая предсказывает будущие осложнения

НbA1с - гликозилированный гемоглобин -
Результат не ферментативной реакции
между гемоглобином А, содержащемся в
эритроцитах, и глюкозой сыворотки
крови.

**Концентрация НbA1с обусловлена средним
уровнем глюкозы, который существует в
течение жизни эритроцита**




О чем говорит HbA1c

Эритроциты имеют разный возраст,
для усредненной характеристики уровня
глюкозы,
связанной с HbA1c,
ориентируются
на полупериод жизни эритроцитов - 60 суток


Уровень HbA1c свидетельствует:

- об уровне глюкозы натощак,
- о препрандиальном и
- о постпрандиальном
уровнях глюкозы **одновременно.**

HbA1c характеризует средний уровень
глюкозы на протяжении последних 1- 2
месяцев




НbA1с и осложнения сахарного диабета



HbA1c – предиктор макро- и микрососудистых осложнений

**Риск инфарктов
миокарда повышается
с уровня HbA1c,
который обычно
считается нормальным
- 5.5%.**

**Риски
микрососудистых
осложнений при HbA1c
выше 9% - возрастают
быстрее, чем
кардиориски**



HbA1c – предиктор фатальных и нефатальных инфарктов миокарда

Повышение уровня HbA1c на 1% связано повышением риска фатальных и нефатальных ИМ на 14%.

Связь между уровнями HbA1c и показателями рисков - линейна.


Кардиориски возрастают уже при уровнях HbA1c, меньших, чем 7%, которые считаются нормальными

Для лиц, не имеющих диабета, при HbA1c ниже 4.6%, связи между HbA1c и кардиорисками нет.

Но при уровнях 4.6% и выше - Кардиориски возрастают.

У лиц, не имеющих диабета, «нормальные» уровни HbA1c 4.6% - 6.0% связаны с кардиорисками.

Selvin E, et al Diabetes Care. 2005, 28(8):1965-1973.



HbA1c - предиктор смертности

У мужчин и женщин
возрастом от 45 до 79 лет
повышение HbA1c на 1% связано
с повышением риска
общей смертности на 20-30%.

Снижение HbA1c на 1% связано
с понижением рисков
осложнений на 21%.

При снижении HbA1c на 1%,
смертность от

- диабета снижалась на 15-27%,
- от инфарктов - на 8% - 21%
- от микрососудистых осложнений на 34-41%.

Khaw KT et al. Ann Intern Med.

2004; 141(6): 413-420.

HbA_{1c} and Mortality

	<5.0% (N = 1204)	5.0 – 5.4% (N = 1605)	5.5 – 6.9% (N = 1611)	>7.0% ** (N = 81)
Mortality at Follow-up				
<u>All Cause</u>				
Rate*	1.65	2.33	3.43	4.35
Relative Risk	1.00	1.41	2.07	2.64
<u>CV-Disease</u>				
Rate*	0.50	1.27	1.24	2.54
Relative Risk	1.00	2.53	2.46	5.04
<u>IHD</u>				
Rate*	0.31	0.86	0.87	1.63
Relative Risk	1.00	2.74	2.77	5.20

*Per 100 patient years adjusted for known risk factors.

**Known diabetes excluded.

EPIC-NORFOLK Study; BMJ 322:1, 2001

НbA1с и тяжесть повреждений коронарных артерий

Ангиография и определение уровней НbA1с
у больных диабетом 2 типа с сердечной болью

Нb A1с - 6.68 % - стенозов в сосудах нет


Нb A1с - 8.0 % - стеноз одного сосуда

Нb A1с - 8.8 3% - стеноз двух сосудов

Нb A1с - 10.40 % - стеноз в 3-4 сосудах

«Чем выше НbA1с – тем больше
поврежденных коронарных сосудов»


Ravipati G et al Association of hemoglobin A(1c) level with the severity of coronary artery disease in patients with diabetes mellitus Am J Cardiol. 2006 Apr 1; 97(7):968-9



HbA1c - предиктор ишемических ИНСУЛЬТОВ

**Повышенный уровень
HbA1c – независимый
фактор риска инсульта
как у лиц, страдающих
диабетом, так и у не
диабетиков.**

Selvin E et al, Lancet Neurol.
2005; 4(12):821-826.



НbA1с – предиктор осложнений периферической сосудистой системы


**Повышенные уровни НbA1с
предсказывают 4 типа
микрососудистых осложнений**

Skyler JS Endocrinol Metab Clin
North Am.

1996 ; 25(2):243-254

**Повышение НbA1с на 1 %
связано с повышением риска
микрососудистых
заболеваний на 28% .**

Adler AI, et al Diabetes Care.
2002;25(5):894-899



НbA1c и контроль осложнений диабета

Риски обратимы

Согласно трем
независимым
широкомасштабным
исследованиям
снижение НbA1c на
1%

приводило
к значительному
снижению риска

- ретинопатий,
- нефропатий,
- нейропатий
- сердечно-
сосудистых
заболеваний

Lower A1C Reduces Incidence of Complications

A1C	<u>DCCT</u> 9 → 7%	<u>Kumamoto</u> 9 → 7%	<u>UKPDS</u> 8 → 7%
Retinopathy	63%	69%	17-21%
Nephropathy	54%	70%	24-33%
Neuropathy	60%	—	—
Macrovascular disease	41%*	—	16%*

*Not statistically significant.

Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) Research Group. *N Engl J Med.* 1993;329:977-986.

Ohkubo Y et al. *Diabetes Res Clin Pract.* 1995;28:103-117.

UK Prospective Diabetes Study Group (UKPDS) 33. *Lancet.* 1998;352:837-853.

A blue-tinted image of a glass pyramid floating on a body of water. The pyramid is transparent, showing internal reflections and refractions. Its reflection is clearly visible on the rippling water surface. The background is a clear blue sky.

Гликозилированный гемоглобин HbA1c – предиктор рисков беременности и плода.

HbA1c и риски при беременности

Определение HbA1c незаменимо для больных диабетом женщин как при планировании беременности, так и на ее протяжении.

Повышенный уровень HbA1c на протяжении 6 месяцев до зачатия и в течение I триместра беременности коррелирует с ее негативным исходом.


Жесткий контроль за уровнем HbA1c позволяет снизить частоту пороков развития плода с 33% до 2%.

Roland JM et al. Diabet Med. 2005 Dec;22(12):1774-1777



НbA1с при беременности

Зависимость частоты самопроизвольных
абортов от уровня гликозилированного
гемоглобина




НbA1с при беременности

Зависимость частоты возникновения врожденных пороков развития новорожденных от уровня НbA1с в крови женщин с СД в первом триместре беременности

Уровень НbA1с, %	Количество новорожденных с пороками развития, %
< 6,9	0 – 1
7,0 – 8,5	4 -- 5
8,6 – 9,9	10 – 15
10,0 – 14,0	20
> 14	40

Для нормального развития плода необходимо, чтобы НbA1с был менее 6,4%

Арбатская Н.Ю. Сахарный диабет 1 типа и беременность.
Фарматека, 2002, №5, с.30–36



HbA1c - предиктор колоректального рака


Нарушения метаболизма глюкозы связаны с риском возникновения рака прямой кишки.

Наименьший риск наблюдается при HbA1c ниже 5%, затем риск возрастает с ростом уровня HbA1c.

Диабеты повышают риск рака прямой кишки в 3 раза, уровень HbA1c — количественный показатель этого риска.

Khaw KT, et al Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2004; 13(6):915-919






**Свободные жирные кислоты -
новый маркер инсулинрезистентности
и предиктор ее осложнений
NEFA Non-esterified fatty acids**

Взаимосвязь между атеросклерозом и инсулинрезистентностью

Interrelation Between Atherosclerosis and Insulin Resistance



Инсулинрезистентность и дислипидемия

Mechanisms Relating Insulin Resistance and Dyslipidemia

Fat Cells

Liver



Insulin

Инсулинрезистентные жировые клетки интенсивно расщепляют содержащиеся в них триглицериды и высвобождают образовавшиеся свободные жирные кислоты (СЖК) в кровоток.


Это происходит как при ожирении, так и без него. СЖК поглощаются печенью и там превращаются в триглицериды.

СЖК - новый маркер инсулинрезистентности



Инсулинрезистентность и дислипидемия


Mechanisms Relating Insulin Resistance and Dyslipidemia



**Повышение в печени
триглицеридов
стимулирует образование
Апо В и X-ЛПОНП,
что ведет к дислипидемии**


Инсулинрезистентность и дислипидемия

Mechanisms Relating Insulin Resistance and Dyslipidemia



При высоком уровне Х-ЛПОНП и нормальном уровне холестерин эфир трансферазы (cholesteryl ester transfer protein - CETP) триглицериды из Х-ЛПОНП переходят в Х-ЛПВП, а холестерин из Х-ЛПВП переходит в Х-ЛПОНП. В результате образуются: богатые холестерином очень атерогенные ремнантные частицы Х-ЛПОНП и Х-ЛПВП, содержащий много триглицеридов и мало холестерина. Такие Х-ЛПВП теряют триглицериды (из-за гепатитной липазы) и Апо А1. В итоге **уровень антитерогенного Х-ЛПВП понижается**

Инсулинрезистентность и дислипидемия



При высоком уровне X-ЛПОНП, богатых триглицеридами, фермент CETP переносит триглицериды из X-ЛПОНП в X-ЛПНП, и переносит холестерин из X-ЛПНП в X-ЛПОНП. Богатые триглицеридами X-ЛПНП из-за гепатитной или липопротеиновой липазы теряют триглицериды, уменьшаются в размерах и становятся **очень атерогенными мелкими плотными X-ЛПНП**

Свободные жирные кислоты

Повышенный уровень СЖК –


фактор риска:

- инсулинрезистентности,**
- гиперинсулинемии**
- метаболического синдрома и**
- сердечно-сосудистых заболеваний**

**Нормальные значения –
0,1 – 0,5 ммоль/л**



Можно ли предсказывать будущее?



**Нам не дано предугадать,
Как наше слово отзовется,
Но нам предчувствие дается,
Как нам дается благодать.**

Ф.И. Тютчев