

ЗАДАЧА № 1

Больная, 48 лет, обратилась к врачу-терапевту с жалобами на постоянную общую слабость, повышенную утомляемость, быструю потерю веса (около 6 кг), ночной гипергидроз, отсутствие аппетита и незначительную температуру (37,2–37,5°C). Периодически возникал продуктивный кашель с выделением слизисто-гнойной мокроты. Через некоторое время появилась небольшая кровохаркающая примесь в мокроте.

Анамнез: Последние три месяца заметила постепенное ухудшение состояния здоровья, связанное с появлением вышеуказанных симптомов.

Анамнез жизни: работает врачом-педиатром в детской больнице на протяжении 25 лет. Основные должностные обязанности включали прием детей с различной патологией, включая хронический бронхит, бронхиальную астму, ОРВИ и пневмония.

Объективно: Температура тела — нормальная, общее состояние удовлетворительное, кожные покровы бледные. Дыхание жесткое, ЧДД - 24 в минуту), ослабленное в верхних долях, аускультативно выслушиваются сухие хрипы. Тоны сердца приглушённые, ритм правильный, ЧСС — 84 уд/мин. Живот мягкий, безболезненный. АД=130/80 мм рт.ст. Живот не напряжен. Печень по краю рёберной дуги. Симптом поколачивания по поясничной области отрицательный с обеих сторон. Отёков нет.

Дополнительные исследования: Рентгенография органов грудной полости показала множественные очаговые тени в верхних долях обоих легких.

1. Какой предварительный диагноз наиболее вероятен у данной пациентки?
2. Назовите ведущие факторы риска развития данной патологии у медицинских работников
3. Перечислите дополнительные методы обследования, необходимые для подтверждения диагноза, составьте план консультаций профильных специалистов.
4. Какие изменения произошли в организме пациентки вследствие длительного пребывания в среде с высоким риском заражения туберкулезом?
5. Какое значение имеет вакцинация против туберкулеза (БЦЖ) в формировании иммунитета у медицинских работников?
6. Какие защитные средства должны использовать медработники в своей ежедневной практике для минимизации риска заражения туберкулезом?
7. Какие меры профилактики туберкулеза предусмотрены для медицинских работников согласно действующему законодательству РФ?