

Тестовый контроль по теме «Профессиональные заболевания от воздействия биологических факторов»

1. Название «легкое фермера» относится к
 - а) токсическому пневмониту
 - б) саркоидозу легких
 - в) гистиоцитозу легких
 - г) гиперчувствительному пневмониту
2. Наиболее частой формой профессионального туберкулеза у медицинских работников является
 - а) туберкулема
 - б) очаговый туберкулез
 - в) костный туберкулез
 - г) инфильтративный туберкулез
3. Наибольший удельный вес среди медицинских учреждений различного профиля, в которых зарегистрирован туберкулез у медицинских работников, составляют
 - а) интернаты для пациентов с хроническими психическими заболеваниями
 - б) судебно-медицинские экспертизы
 - в) противотуберкулезные учреждения
 - г) лечебные учреждения общего профиля
4. Профессиональные заболевания среди медицинских работников устанавливаются чаще
 - а) врачами-инфекционистами
 - б) врачами-анестезиологами
 - в) врачами-хирургами
 - г) врачами-фтизиатрами
5. К наиболее частым факторам, приводящим к возникновению профессиональных заболеваний у медицинских работников, относят
 - а) биологические агенты
 - б) антибиотики
 - в) химические вещества
 - г) перенапряжение отдельных органов и систем
6. Наиболее часто у медицинских работников устанавливается профессиональный
 - а) дерматит
 - б) туберкулез
 - в) бруцеллез
 - г) кандидоз
7. Наиболее вероятно развитие профессионального туберкулеза у медицинских работников в течение _____ лет работы в контакте с микобактерией
 - а) более 10
 - б) первых трех
 - в) первых 5
 - г) первых 10

8. По структуре профессиональных заболеваний у медицинских работников лидирующую позицию занимают

- а) психические заболевания
- б) интоксикации и заболевания опорно-двигательного аппарата
- в) аллергические заболевания
- г) инфекционные заболевания

9. Медицинские работники, перенесшие острый вирусный гепатит, выздоровевшие или вирусоносители

а) могут работать в своей профессии с соблюдением техники безопасности

- б) подлежат однозначному переводу
- в) могут работать в поликлинике
- г) не могут работать в сфере здравоохранения

10. Профессиональный кандидоз развивается у

- а) лаборантов медицинских лабораторий
- б) работников кондитерских пищевых предприятий
- в) зубных врачей
- г) работников производства антибиотиков

11. Профессиональные дерматозы вызывают профессиональные вредности

- а) пылевые, психо-эмоциональные
- б) микроклиматические
- в) биологические, эргономические
- г) химические, физические, инфекционные

12. К производственным факторам, которые редко вызывают дерматоз, относятся

- а) химические вещества
- б) инфекционные агенты
- в) кислоты
- г) щелочи

13. Профессиональные дерматозы чаще всего могут быть вызваны

- а) бактериями
- б) вирусами
- в) грибами
- г) клещами

14. Поверхностная трихофития может быть профессиональным заболеванием у

- а) медицинских работников
- б) животноводов
- в) парикмахеров
- г) работников вивариев, зоопарков

15. Профессиональный кандидоз редко развивается у

- а) работников швейных фабрик
- б) лаборантов медицинских лабораторий, проводящих исследование на

чувствительность к антибиотикам

- в) работников фруктово-консервных мероприятий
- г) зубных врачей, работников производства белково-витаминных

концентратов

16. Если у животновода возникла лихорадка после рабочего дня, кашель, одышка, боли в грудной клетке, то предположительным диагнозом является

- а) острый респираторный синдром
- б) пневмония
- в) биссиниоз
- г) экзогенный аллергический альвеолит

17. Отсутствие положительной динамики на рентгенограмме после терапии антибиотиками у больного, работающего в контакте с патогенной микрофлорой, с предварительным диагнозом пневмония, означает наличие

- а) саркоидоза
- б) экзогенного аллергического альвеолита
- в) эозинофильной пневмонии
- г) бруцеллеза

18. Социально значимым заболеванием является

- а) туберкулез
- б) дерматофития
- в) краснуха
- г) эпидемический паротит

19. Право установления связи инфекционного заболевания с профессией принадлежит

- а) специализированному профпатологическому учреждению
- б) медицинской организации по месту жительства
- в) инфекционной больнице
- г) поликлинике по месту жительства

20. Заживление бородавчатого туберкулеза кожи сопровождается образованием

- а) эритемы
- б) участка шелушения
- в) рубца
- г) участка пигментации

21. Для острого экзогенного аллергического альвеолита характерным является

- а) преходящая клинико-рентгенологическая картина
- б) абсцедирование легкого
- в) персистирующее воспаление
- г) сотовое легкое

22. Генерализованные формы сибирской язвы чаще возникают при заражении _____ путем

- а) перкутанным
- б) аэрогенным
- в) алиментарным
- г) ректальным

23. К профессиональным аллергенам животного происхождения относят

- а) эпидермис животных
- б) шелк
- в) мед
- г) пыль клещей

24. Главным отличием сибиреязвенного карбункула от банального фурункула или карбункула является

- а) время появления
- б) внешний вид

- в) отсутствие болевого синдрома
 - г) локализация
25. Реинфицирование при бруцеллезе возможно чаще через (в годах)
- а) 1
 - б) 15-20
 - в) 10-15
 - г) 3-5
26. Профессиональный бруцеллез характеризуется поражением
- а) бронхо-легочной системы
 - б) опорно-двигательного аппарата, нервной и половой систем
 - в) мочеполовой системы
 - г) сердечнососудистой системы
27. Профессиональный туберкулез кожи чаще развивается у
- а) доярок
 - б) полеводов
 - в) механизаторов
 - г) животноводов
28. При рентгенологическом исследовании в динамике 3-х дней в легких у птичницы исчезли двусторонние мелкоочаговые изменения характерные для
- а) острого бронхита
 - б) экзогенного аллергического альвеолита
 - в) пневмонии
 - г) бронхиальной астмы
29. Основным резервуаром для возбудителей геморрагической лихорадки с почечным синдромом являются
- а) свиньи
 - б) овцы
 - в) крупный рогатый скот
 - г) мыши
30. Наличие при профессиональной бронхиальной астме бактериальной аллергии
- а) зависит от характера условий труда
 - б) возможно вне зависимости от условий труда
 - в) никогда не встречается
 - г) полностью исключается
31. В случае продолжения работы в прежних условиях при экзогенном аллергическом альвеолите рецидив заболевания
- а) не известен
 - б) невозможен
 - в) сомнителен
 - г) возможен
32. Стажем работы, предшествующим развитию профессионального бронхита, чаще является (в годах)
- а) до 10
 - б) свыше 10
 - в) до 3
 - г) до 5

33. Если работники проводят работы с возбудителями (или имеют контакт с больными) особо опасных инфекционных заболеваний условия труда работников относят

- а) к 1-му классу вредных условий труда
- б) к 4-му классу опасных (экстремальных) условий труда
- в) ко 2-му классу допустимых условий
- г) к 3-му классу вредных условий труда

34. Отбор проб воздуха для контроля содержания микроорганизмов проводится путем

- а) аспирации их из воздуха в водную среду
- б) отбора проб в пробирки
- в) аспирации их из воздуха на поверхность плотной питательной среды
- г) отбора проб в специальные жидкостные или воздушные поглотители

35. К общим (непрофессиональным) заболеваниям от воздействия биологических факторов в условиях производственного контакта относят

- а) бруцеллез
- б) туберкулез легких
- в) сибирскую язву
- г) ревматизм

36. При профессиональных заболеваниях верхних дыхательных путей при эндоскопическом обследовании слизистой оболочки глотки выявляют

- а) отсутствие отека язычка
- б) пастозность и атрофию
- в) деформацию язычка и атрофию слизистой
- г) цианоз

37. К нормальным показателям количества лейкоцитов крови относят

- а) $4.0 \times 10^9/\text{л} - 4.2 \times 10^9/\text{л}$
- б) $3.4 \times 10^9/\text{л}$
- в) $4.5 \times 10^9/\text{л} - 9.0 \times 10^9/\text{л}$
- г) $3.1 \times 10^9/\text{л}$

38. Показанием к санаторно-курортной реабилитации при профессиональных заболеваниях является

- а) период ремиссии
- б) обострение заболевания
- в) смена времени года
- г) дообследование пациента

39. Профессиональная экзема отличается от непрофессиональной

- а) склонностью к обострениям
- б) локализацией поражения
- в) более упорным течением
- г) остротой воспалительного процесса

40. Для снижения интенсивности воздействия вредных факторов на организм работающих необходимо применять

- а) защиту временем, рационализация режимов труда, изменение технологии
- б) рациональное трудоустройство
- в) изменение технологии

- г) усиленное питание
- 41. Степень утраты профессиональной трудоспособности определяется в
 - а) субъективных характеристиках
 - б) десятичных долях
 - в) долях от целого
 - г) процентах
- 42. Не является компонентом бронхиальной обструкции
 - а) ларингоспазм
 - б) задержка мокроты
 - в) воспаление бронхов
 - г) бронхоспазм
- 43. При экзогенном аллергическом альвеолите необходима дифференциальная диагностика с
 - а) силикозом
 - б) милиарным туберкулезом
 - в) крупозной пневмонией
 - г) бронхиальной астмой
- 44. Для диагностики аллергического ринита применяют
 - а) рентгенографию околоносовых пазух, общий анализ мочи и кала на яйца гельминтов
 - б) провокационные тесты, пробное лечение гормональными препаратами и бактериологическое обследование полости носа
 - в) скарификационные кожные тесты, исследование IgE в крови и цитологию носового секрета
 - г) специфическую иммунотерапию, рентгенографию органов грудной клетки и функцию внешнего дыхания
- 45. Для профессионального бронхита характерно
 - а) острое начало
 - б) постепенное медленное начало
 - в) подострое начало
 - г) стремительное начало