






*Хирургическая анатомия
плеча*


Границы






Поверхностные
образования
плеча

Мышцы передней области плеча







Мышцы задней области плеча




Проекция плечевой артерии






Плечевая артерия,
коллатеральная сеть
локтевого сустава.




Лучевой нерв и глубокая артерия плеча

Топография лучевого нерва




Локтевой и срединный нервы






Топография мышечно-кожного нерва

Поперечный распил плеча в средней трети




Поперечный распил плеча в средней трети (препарат)




Ампутация плеча в средней трети двухлоскутным способом.

а — сформировано два кожно-фасциальных лоскута, пересечены мышцы и кость, дистальный отдел конечности удалён, б — рана ушита узловыми швами





а



б

*Хирургическая анатомия
плечевого сустава*





Формирование плечевого сустава





Полость плечевого
сустава



Рентгенограмма
плечевого
сустава

Пункция плечевого сустава




Разновидности вывихов плечевого сустава



Нижний вывих плеча.

Механизм возникновения
этого повреждения —
чрезмерное отведение (А).

Повреждение не всегда
сопровождается разрывом
вращательной манжеты и
надрывом нижней части
капсулы (Б).



Задний вывих плеча

А. Нормальная эллипсоидная форма, образуемая головкой плеча в суставной впадине.

Б. При заднем вывихе эта форма нарушается и наблюдается внутренняя ротация бугорка.

